
Sciurus vulgaris Eichhörnchen 1957 bis 2011
TAFELJURA
KETTENJURA
JURA-VORKETTE
FLACHLAND
MOLASSE-HÜGELLAND
AARAU
OLTEN
BALSTHAL
OENSINGEN
DIEGTEN
ROHR
ERLINSBACH
STÜSSLINGEN
LÄUFELFINGEN
Unter Hauenstein
WISEN
LOSTORF
TRIMBACH
WINZNAU
GÖSGEN
EPTINGEN
HA.-IF.
Belchenfluh
Passwang
LANGENBRUCK
Ober Hauenstein
MÜMLISWIL-RAMISWIL
HÄGENDORF
WANGEN
RI
Niederamt
DULLIKEN
HOLDERBANK
EGERKINGEN
LAUPERSDORF
KAPPEL
OBERBUCHSITEN
Dünnern
HERBETSWIL
Mittelgäu
WOLFWIL
Aare
250
245
240
235
620
625
630
635
1'000 m
sehr viele Spuren
viele Spuren
mehrere bis viele Spuren
1 bis mehrere Spuren
Sehr viele (> ca. 100) Indiv.
Viele (> ca. 25) Individuen
Mehrere bis viele Individuen
Mehrere (3–9) Individuen
1–2 Individuen
Beobachtungsorte ohne
Nachweise von G. Artmann