

# Waldschlag Schachen Obergösgen - Artenliste Georg Artmann-Graf

Koordinaten: 634000 244200 Höhe: 400 m ü. M. Exposition: Fläche: Neigung; 1

Beobachtungsdauer: BP1 (2012 bis 2013): 49 Std. 00 Min. BP2 (2014 bis 2021): 30 Std. 50 Min.

	BP1	A	B	BP2	A	B	BP alle	A	B
<b>Berechnung des Seltenheitsindex der Fauna:</b>									
Anzahl der Ereignisse:		990	419		242	87		1442	506
Summe der Ereignisse:		2932	2097		1230	498		4162	2595
<b>Seltenheitsindex:</b>		<b>3,26</b>	<b>5,00</b>		<b>2,27</b>	<b>5,72</b>		<b>2,9</b>	<b>5.13</b>

erste Beobacht. 2012-2014 letzte Beobacht. 2021 Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet Bemerkungen zur Art in der Region Seltenheits-Index

## WEICHTIERE

### MOLLUSCA STAMM

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beobacht. 2012-2014	letzte Beobacht. 2021	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-Index
Grosse Wegschnecke	Arion rufusArt	2021	2021	1 Ab1	früher häufig gefunden, wird neuerdings von der Spanischen Wegschnecke verdrängt	2

F = Fundort BP = Beobachtungsperiode Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Max. Ab = grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe: 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region: ( ) in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art noch nicht inventarisiert & Art, die zu dieser Zeit in der Region noch nicht bekannt war \* in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr regelmässig inventarisiert \*\* in dieser Beobachtungsperiode habe ich die Art nicht mehr inventarisiert o in dieser Beobachtungsperiode habe ich den Gesang nur noch schwach wahrgenommen oo in dieser Beobachtungsperiode habe ich den Gesang nicht mehr wahrgenommen + diese Werte sind so hoch, weil ich die Arten wenig beachtet habe: Spinnentiere und nachfliegende Falter Schmetterlinge Regio Basiliensis: Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600-645 / 235-250 Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580-645 / 235-250

**Seltenheitswerte:** Für die bewerteten Taxa (Namen) gilt: alle A: wenn jeder Seltenheitswert für alle Arten bei jeder Behebung gezählt wird alle B: wenn jeder Seltenheitswert für alle Arten nur 1 Mal gezählt wird

\* Dieser Seltenheitswert liegt nahe dem unteren Grenzwert. Beispiel: 16\* bedeutet, dass 8 oder 9 Ereignisse vorliegen. Bei 10 Ereignissen wäre der Seltenheitswert 08

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011	Beobachtungsgebiet			
Weitmündige Glanzschnecke	Aegopinella	nitensArt	2012	2014	5	1	Max. Ab2		sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Genabelte Strauchschnecke	BradybaenaG neu: Fruticola	fruticumArt	2012	2013	2		Max. Ab1		sehr häufig gefunden	1
Riemenschnecke	HelicodontaG	obvolutaArt	2012	2013	5		Max. Ab2		häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Seidenhaarschnecke	Trochulus alt:Trichia	sericeusArt	2013	2013	4		Max. Ab1		sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Gemeine Heideschnecke	HelicellaG	italaArt	2012	2012	1		Ab1		sehr häufig gefunden	1
Rötliche Laubschnecke	MonachoidesG alt: Perforatella	incarnatusArt	2012	2016	5	2	Max. Ab2		häufig ngefunden, gilt nach Literatur in der Schweiz nördlich der Alpen als sehr häufig	1
Gefleckte Schnirkelschnecke	AriantaG	arbustorumArt	2012	2012	1		Ab1		in beschatteten und/oder feuchten Lebensräumen häufig gefunden, gilt nach	1
Schwarzmündige Bänderschnecke	Cepaea	nemoralisArt	2013	2013	2		Max. Ab1		sehr häufig gefunden	1
Weissmündige Bänderschnecke	Cepaea	hortensi sArt	2012	2012	1		Ab1		häufig gefunden	2
Weissmündige Bänderschnecke	Cepaea	hortensi sArt	2012	2021	12	11	Max. Ab2		häufig gefunden	2
<b>GLIEDERFÜSSLER</b>	<b>ARTHROPODA STAMM</b>									
<b>SPINNENTIERE</b>	<b>ARACHNIDA KLASSE</b>									
Herbstspinnen-Art	Metellina	segmentataArt	2012	2019	3	1	Max. Ab2		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 10	1
Gartenkreuzspinne	Araneus	diadematusArt	2013	2017	2		Max. Ab1		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 7	1
Wespenspinne, Zebraspinne	ArgiopeG	bruennichiArt	2017	2017		1	Ab1		häufig gefunden	2
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	triangularisArt	2013	2019	4	6	Max. Ab5		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 4	1
<b>Wolfsspinnen Familie</b>	<b>(LycosidaeF) Familie</b>		2013	2016	3	2	Max. Ab5		Familie sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	amentataArt	2013	2013	1		Ab1		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 204	1
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	hortensisArt	2013	2014	1	1	Max. Ab1		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL häufig: 219	1
Wolfsspinnen-Artengruppe	Pardosa	lugubrisKomplex	2013	2016	7	2	Max. Ab4		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL sehr häufig: 1571	1
Listspinne	PisauraG	mirabilisArt	2013	2019	1	3	Max. Ab1		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 9	1

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011	Beobachtungsgebiet			
Labyrinthspinnengattung	AgelenaG	Gattung	2013	2020	6	15	Max. Ab4		Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1
Zartspinne	AnyphaenaG	accentuataArt	2013	2013	1		Ab1		mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL mässig häufig: 35	4
Grüne Krabbenspinne	DiaeaG	dorsataArt	2013	2013	1		Ab2		mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 2 Individuen	-
Veränderliche Krabbenspinne	MisumenaG	vatiaArt	2013	2018	1	2	Max. Ab3		sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 14	1
Krabbenspinnengattung	XysticusG	Gattung	2013	2013	1		Ab1		Gattung sehr häufig gefunden	2
Springspinnen-Art	Evarcha	arcuataArt	2016	2020		2	Max. Ab1		häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum	2
Springspinnen-Art	Evarcha	falcataArt	2016	2016		2	Max. Ab1		mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 4	4
Springspinnen-Art	Heliophanus	cupreusArt	2013	2013	2		Max. Ab1		häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL wenig häufig: 12	2
<b>KREBSTIERE</b>	<b>(Crustacea)</b>									
	<b>KLASSE</b>									
Rollassel-Art	Armadillidium	opacumArt	2013	2013	1		Ab1		mässig häufig gefunden, aber wahrscheinlich im Versteckten häufig	2
<b>VIELFÜSSER</b>	<b>MYRIAPODA</b>									
	<b>KLASSE</b>									
Schnurfüssergattung	JulusG	Gattung	2013	2013	1		Ab1		Gattung wenig häufig gefunden, nicht inventarisiert	08
<b>INSEKTEN</b>	<b>HEXAPODA</b>									
	<b>KLASSE</b>									
<b>EINTAGSFLIEGEN</b>	<b>(EphemeropteraO)</b>	<b>Ordnung</b>								
Eintagsfliege nicht bestimmt	(Ephemeroptera)	Ordnung non	2013	2013	1		Ab1		mässig häufig gefunden, nicht inventarisiert	-
Eintagsfliege nicht bestimmt	(Ephemeroptera)	Ordnung non	2013	2013	1		Ab1		mässig häufig gefunden, nicht inventarisiert	-
<b>LIBELLEN</b>	<b>(Odonata)</b>	<b>Ordnung</b>								
Gebänderte Prachtlibelle	CalopteryxG	splendensArt	2013	2020	2	4	Max. Ab2		Gattung an Flüssen und Bächen häufig gefunden	2
Gemeine Winterlibelle	SympecmaG	fuscaArt	2013	2019	2	2	Max. Ab1		häufig gefunden	2
Gemeine Federlibelle	PlatycnemisG	pennipesArt	2013	2020	3	5	Max. Ab2		an stehenden Gewässern mässig häufig gefunden,	4
Frühe Adonislibelle	PyrrhosomaG	nymphulaArt	2013	2013	1		Ab1		an stehenden Gewässern häufig gefunden	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Hufeisen-Azurjungfer	Coenagrion	puellaArt	2013	2013	2		Max. Ab1	an stehenden Gewässern häufig gefunden	2
Blaugrüne Mosaikjungfer	Aeshna	cyaneaArt	2012	2013	3		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, oft auch weitab von Gewässern	1
Grüne Keiljungfer	Ophogomphus G	caeciliaArt	2013	2013	1		<b>einzigster persönlicher Fund in der Region</b>	<b>erst 1 Mal gefunden</b>	64
Grosse Heidelibelle	Sympetrum	striolatumArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden, auch weitab von Gewässern, besonders im Herbst	2
<b>OHRWÜRMER</b>	<b>(Dermaptera O)</b>								
Wald-Ohrwurm	ChelidurellaG	acanthopygiaArt	2013	2013	3		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	-
<b>Schaben Ordnung</b>	<b>(BlattodeaO) Ordnung</b>								
Waldschabengattung	EctobiusG Gattung		2013	2013	1		Ab2	Gattung häufig gefunden	2
Podas Waldschabe	Ectobius	sylvestrisArt	2013	2013	3		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Gemeine Waldschabe	Ectobius	lapponicusArt	2012	2016	1	2	Max. Ab2	häufig gefunden	-
<b>HEUSCHRECKEN</b>	<b>Saltatoria Ordnung</b>								
Gemeine Sichelschrecke	PhaneropteraG	falcataArt	2016	2016		1		früher mässig häufig gefunden, jetzt in Ausbreitung begriffen und häufig	2
Grünes Heupferd	TettigoniaG Gattung	viridissimaArt	2016	2016		2		sehr häufig gefunden	1
Gewöhnliche Strauchschrecke	PholidopteraG Gattung	griseopteraArt	2013	2021	13	13	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Feldgrille	GryllusG	campestrisArt	2020	2020		2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, in letzter Zeit zunehmend im Flachland	2
Waldgrille	NemobiusG	sylvestrisArt	2013	2021	13	15	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1
Säbeldornschrecke	Tetrix	subulataArt	2013	2014	3	1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Langfühler-Dornschrecke	Tetrix	tenuicornisArt	2012	2014	8	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Rote Keulenschrecke	Gomphocerus alt und neu:	rufusArt	2013	2019	7	9	Max. Ab4	sehr häufig gefunden	1
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulusArt	2012	2019	6	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	-
Brauner Grashüpfer	Chorthippus	brunneusArt	2012	2013	5		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011	Beobachtungsgebiet			
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelusArt	2017	2020			4		sehr häufig gefunden	1
<b>SCNABELKERFE</b>	<b>Heteroptera</b> Ordnung									
Gras-Schildwanze	EurygasterG	mauraArt	2013	2013	1			Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4
Streifenwanzen-Art	GraphosomaG	lineatumArt	2013	2013	1			Ab1	sehr häufig gefunden	1
Brachwanzen-Art	Sciocoris	microphthalmuArt	2013	2013	1			Ab1	<b>selten gefunden</b>	16
Dunkler Dickwanst	Eusarcoris	fabriciiArt	2013	2013	1			Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	08
Baumwanzen-Art	HolcostethusG	vernalisArt	2012	2013	5			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	4
Baumwanzen-Art	Carpocoris	purpureipennisArt	2013	2013	1			Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Beerenwanze	DolycorisG	baccarumArt	2013	2013	4			Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1
Grüne Stinkwanze	Palomena	prasinaArt	2013	2013	5			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	2
Randwanzen-Art	Gonocerus	acuteangulatusArt	2013	2013	1			Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	08
Randwanzen-Art	EnoplopsG	scavaArt	2013	2013	2			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Leder- oder Randwanzen-Art	CoreusG	marginatusArt	2012	2019	9	3		Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Glasflügelwanzen-Art	CorizusG	hyoscyamiArt	2013	2013	2			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Glasflügelwanzen-Art	Rhopalus	maculatusArt	2013	2013	5			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Glasflügelwanzen-Art	Rhopalus	subrufusArt	2013	2013	1			Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	2
Glasflügelwanzen-Art	Stictopleurus	punctatonervosusArt	2013	2017	9	2		Max. Ab3	häufig gefunden	2
Glasflügelwanzen-Art	Stictopleurus	abutilonArt	2013	2018	1	1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Feuerwanze	PyrrhocorisG	apterusArt	2012	2019	12	6		Max. Ab4	sehr häufig gefunden, lokal oft massenhaft, besonders an Linden	1
Bodenwanzen-Art	Rhyparochromus	vulgarisArt	2013	2013	1			Ab1	wenig häufig gefunden, vor allem in der Wohnung	08
Gescheckte Rindenwanze	AradusG	depressusArt	2013	2013	1			Ab1	<b>selten gefunden</b> , in den Fallen der WSL selten: 4	16

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste letzte Beob- Beob- 1990 – 2002 acht. acht. 2001 2011				Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index	
Raubwanzen-Art	RhinocorisG	annulatusArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Sichelwanzen-Art	AptusG	mirmicoidesArt	2017	2017		1	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 36	2
Sichelwanzen-Art	Nabis	ferusArt	2019	2019		1	Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	-
Sichelwanzen Artengruppe	Nabis	rugosusGruppe Artengruppe	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden	2
Behaarte Wiesenwanze	Lygus	rugulipennisArt	2016	2016		1	Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	4
Gemeine Wiesenwanze	Lygus	pratensisArt	2013	2013	2		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 46	2
Wiesenwanzen-Art	Lygocoris	spinolaiArt	2012	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden	08
<b>GLEICHFLÜGLER</b>	<b>Homoptera</b> Ordnung								
Schaumzikade nicht bestimmt	(Cercopidae) non det.		2013	2013	2		Max. Ab1	Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden	1
Erlen-Schaumzikade	AphrophoraG	alniArt	2013	2020	7	4	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Blutzikaden-Art	CercopisG	vulnerataArt	2013	2013	2		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Dornzikade, Buckelzikade	CentrotusG	cornutusArt	2013	2014	1	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	-
Grüne Zwergzikade	CicadellaG	viridisArt	2012	2018	2	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in Feuchtlebensräumen oft massenhaft	1
<b>NETZFLÜGLER</b>	<b>Planipennia</b> Ordnung								
Florfliegen-Art	HypochrysaG	elegansArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Florfliegen-Art	Chrysopa	perlaArt	2012	2014	5	1	Max. Ab3	häufig gefunden	2
Goldauge, Florfliegen-Art	ChrysoperlaG	carneaArt	2013	2018	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern	1
<b>KÄFER</b>	<b>Coleoptera</b> Ordnung								
Sandlaufkäfergattung	CicindelaG Gattung		2013	2013	1		Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Berg-Sandläufer	Cicindela	silvicolaArt	2013	2013	1		Ab2	häufig gefunden	-
Feld-Sandläufer	Cicindela	campestrisArt	2013	2014	2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Strandläufer-Art	Notiophilus	rufipesArt	2013	2013	1		Ab1	<b>selten gefunden</b>	16
Behäbiger Schnellläufer	Harpalus	tardusArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL nur 1 Individuum	08
Dungkugelkäfer-Art	Sphaeridium	scarabaeoidesArt	2013	2013	1		Ab1	selten gefunden, nicht inventarisiert	16*
Schwarzer Schneckenjäger	PhosphugaG	atrataArt	2013	2013	2		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, im Versteckten sehr wahrscheinlich häufig	4
Rothalsige Silphe	OeceptomaG	thoracicaArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden	08
Gemeiner Totengräber	Necrophorus	vespilloArt	2013	2013	2		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	08
Kurzflügelkäfer-Art	Eusphalerum	ophthalmicumArt	2013	2013	2		Max. Ab4	wenig häufig gefunden	08
Raubkäfer-Art (Kurzflügler)	Platydracus	chalcocephalusArt	2013	2013	1		<b>einzigster Fund in der Region</b>	<b>erst 1 Mal gefunden</b>	64
Kurzflügelkäfer-Art	Aleochara	haematopteraArt	2013	2013	1		Ab1	<b>erst 2 Mal gefunden</b>	32
Weichkäfer-Art	Cantharis	rusticaArt	2013	2013	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Variabler Weichkäfer	Cantharis	lividaArt	2013	2013			Ab1	häufig gefunden	2
Rotgelber Weichkäfer	Rhagonycha	fulvaArt	2013	2016	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zweifleckiger Warzenkäfer	Malachius	bipustulatusArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden	2
Warzenkäfer-Art	ClanoptilusG alt: Malachius	elegansArt	2014	2014		1	Ab1	wenig häufig gefunden	08
Schnellkäfer-Art	Ampedus	quercicolaArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden	08
Schnellkäfer-Art	Ampedus	nemoralisArt alt: pomorum	2013	2013	1		Ab1, Totholzbewohner	<b>selten gefunden</b>	-
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes	acuminatusArt	2013	2013	1		Ab1	<b>selten gefunden</b>	16
Mausgrauer Sandschnellkäfer	AdeloceraG neu: Argrypnus	murinaArt neu: murinus	2013	2020	2	1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Rotbauchiger Laubschnellkäfer	Athous	haemorrhoidalisArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden	2
Schnellkäfer-Art	Athous	vittatusArt	2013	2013	4		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Prachtkäfer-Art	Anthaxia	similisArt	2013	2013	1		Ab2	wenig häufig gefunden	08

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Prachtkäfer-Art	Anthaxia	helveticaArt	2013	2013	2		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 27	2
Vierpunkt-Kiefernprachtkäfer	Anthaxia	quadripunctataArt	2020	2020		1	Ab2	häufig gefunden , in den Fallen der WSL mässig häufig: 51	2
Prachtkäfergattung	AgrilusG	Gattung	2013	2013	1		Max. Ab1	Gattung mässig häufig gefunden	4
Heckenkirschen-Prachtkäfer	Agrilus	cyanescensArt	2016	2016		1	Ab1	wenig häufig gefunden	08
Prachtkäfer-Art	Agrilus	angustulusArt	2016	2016		1	Ab1	<b>selten gefunden</b> , in den Fallen der WSL selten: 9	08
Gemeiner Zwergprachtkäfer	TrachysG	minutaArt	2013	2013	1		Ab1	<b>selten gefunden</b> , in den Fallen der WSL selten: 3	08
Pelzkäfer-Art	MegatomaG	undataArt	2013	2013	1		Ab1	erst 1 Mal gefunden, aber kaum inventarisiert, in Wohnungen, Konkurrent des Menschen	64
Glanzkäfergattung	MeligethesG	Gattung	2013	2020	1	1	Max. Ab2	Gattung sehr häufig gefunden	1
Rotfleckiger Faulholzkäfer	TritomaG	bipustulataArt	2013	2013	1		Ab1	<b>selten gefunden</b>	16
Käfer-Art	DitomaG	crenataArt	2013	2013	1		Ab1	erst 1 Mal gefunden, aber kaum inventarisiert	64
Asiatischer Marienkäfer	Harmonia	axyridisArt	2014	2020	&	2	Max. Ab1	häufig gefunden, Neozoon, seit 2007 in Ausbreitung, im Siedlungsraum oft häufig	2
Zweiundzwanzigpunkt	TheaG neu: Propylaea	vigintiduopunctataAr t	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Vierzehnpunktiger Marienkäfer	PropylaeaG	quadridecempunctataA rt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden	2
Scheinbockkäfer-Art	Anoncodes alt: Nacerda, neu	rufiventrisArt	2013	2020	1	2	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gemeiner Schenkelkäfer	Oedemera	femorataArt	2013	2013	2		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Feuerkäfer-Art	Pyrochroa	serraticornisArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden	2
Feuerkäfer-Art	Pyrochroa	coccineaArt	2013	2014	2	1	Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Feuerkäfer-Art	SchizotusG	pectinicornisArt	2013	2013	2		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Blauer Maiwurmkäfer (Oelkäfer-Art)	MeloeG	violaceusArt	2020	2020		1	Ab1	<b>selten gefunden</b>	16
Triungulinus-Larve, Oelkäfer-Larve (nicht bestimmt)	(Meloidae)	(Larve)	2017	2017		1	Ab5	selten gefunden, weil nicht danach gesucht	08
Gebänderter Stachelkäfer	VariimordaG	villosaArt	2013	2013	1		Ab1	sehr häufig gefunden	1

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Dungkäfer-Art	Aphodius neu: Melinopterus	prodromusArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Gartenlaubkäfer	PhylloperthaG	horticolaArt	2013	2014	2	1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Stolperkäfer	ValgusG	hemipterusArt	2013	2013	1		Ab1	seit einigen Jahren in Ausbreitung, derzeit häufig gefunden	2
Gebänderter Pinselkäfer	TrichiusG	fasciatusArt	2013	2020	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Trauer-Rosenkäfer	OxythyreaG	funestraArt	2020	2020		1	Ab1	wenig häufig gefunden, aber in starker Zunahme begriffen	2
Gemeiner Rosenkäfer	CetoniaG	aurataArt	2013	2013	3		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Kleiner Rehschröter	PlatycerusG	caraboidesArt	2013	2013	1		Ab3	mässig häufig gefunden	4
Bissiger Zangenbock	Rhagium	mordaxArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Variabler Stubbenbock	StenocorusG	meridianusArt	2013	2013	2		Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4
Bunter Kugelhalsbock	Acmaeops neu: Dinoptera	collarisArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL selten: 5	4
Roter Schmalbock, Roter Halsbock	Leptura neu: Stictoleptura	rubraArt	2013	2019	1	2	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 36	2
Schwarznahtiger Halsbock, Schwarzschwänziger Schmalbock	Strangalia neu: Stenurella	melanuraArt	2013	2020	2	2	2 E, Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Rothaarbock	PyrrhidiumG	sanguineumArt	2013	2013	1		Ab1	<b>selten gefunden</b> , in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	16
Buchen-Widdercock, Echter Widderbock	Clytus	arietisArt	2013	2013	2		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	2
Gelbschultriger Linienbock	Oberea	pupillataArt	2013	2013	1		Ab1	<b>selten gefunden</b>	16
Rothalsiges Getreidehähnchen	Oulema	melanopusArt	2013	2020	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, hier handelt es sich um zwei sehr ähnliche Arten	1
Maiglöckchenhähnchen	Lilioceris	merdigeraArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden	08*
Johanniskraut-Blattkäfer	Chrysolina alt: Chrysomela	variansArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, an Johanniskraut	4
Erdflohkäfer-Art	Longitarsus	tabidusArt	2013	2013	1		Ab1	erst 1 Mal gefunden, aber meist übersehen oder nicht inventarisiert	32
Rostiger Schildkäfer	Cassida	vibexArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden	08
Rebenstecher, Rebstichler, Zigarrenwickler	Byctiscus	betulaeArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden, gilt nach Einschätzung von Ch. Germann als häufig	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Brauner Schmalbauch, Länglicher Blattrüssler	Phyllobius	oblongusArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Brauner Schmalbauch, Länglicher Blattrüssler	Phyllobius	oblongusArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Gebirgs-Blattrüssler	Phyllobius	arboratorArt	2013	2014	2	1	Max. Ab1	selten gefunden, gilt nach Literatur als wenig häufig	08
Dickkopf-Glanzrüssler	Polydrusus	pterygomalisArt	2013	2014	5	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum, gilt nach Literatur als mässig	4
Gescheckter oder Hirsch-Glanzrüssler	Polydrusus	cervinusArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum, gilt nach Literatur als häufig	2
Seidiger Glanzrüssler	Polydrusus	sericeusArt neu: formosus	2013	2020	4	3	Max. Ab3	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum, gilt nach Literatur als häufig	2
Kupfriger oder Schimmernder Glanzrüssler	Polydrusus	mollisArt	2013	2013	3		Max. Ab2	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum, gilt nach Literatur als mässig	4
Welliger Stängelrüssler	LixusG	pulverentulusArt alt: algirus	2013	2013	1		Ab1	selten gefunden, gilt nach Literatur als wenig häufig	08
Gewöhnlicher Eichelbohrer, Eichelrüssler	Curculio	glandiumArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden, gilt nach Literatur als häufig	2
Buchen-Springrüssler, Buchenblattrüssler	OrchestesG alt: Rhynchaenus	fagiArt	2014	2014		1	Ab4	Frassspuren an Rotbuchen sehr häufig in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1
<b>HAUTFLÜGLER</b>	<b>Hymenoptera</b> Ordnung								
Gespinstblattwespen-Art	Pamphilius	aurantiacusArt	2013	2013	1		Ab1	<b>selten gefunden</b> , in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	16*
Blattwespengattung	AthaliaG	Gattung	2013	2013	1		Ab4	Gattung sehr häufig gefunden	1
Blattwespen-Art	Athalia	circularisArt	2013	2014	5	1	Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	2
Blattwespen-Art	Athalia	cordataArt	2012	2013	6		Max. Ab3	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	2
Blattwespen-Art	Athalia	libertaArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	4
Blattwespen-Art	Tenthredopsis	frieseiArt alt: pavida	2016	2016		1	Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 12	4
Blattwespen-Art	Tenthredo	maculataArt	2013	2013	2		Max. Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	08
Blattwespen-Art	Tenthredo	mesomelaArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	scrophulariaeArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden	08
Blattwespen-Artenkomplex	Tenthredo	marginellaArtengruppe	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden, möglicherweise zwei verschiedene Arten	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Blattwespen-Art	Macrophya	annulataArt alt: ligata	2013	2013	2		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	2
Blattwespen-Art	Macrophya	duodecimpunctataAr t	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Blattwespen-Art	Macrophya	duodecimpunctataAr t	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Blattwespen-Art	Pristiphora	pallidiventrisArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 28	08
Brackwespen-Art nicht bestimmt	Bracon	sp. W	2013	2013	1		Max. Ab1		32+
Brackwespen-Art nicht bestimmt	Bracon	sp. U	2013		1				32+
Brackwespengattung	MicroplitisG Gattung		2014	2014		1		<b>Gattung erst 2 Mal gefunden</b>	4
Schlupfwespen-Art	Vulgichneumon	bimaculatusArt	2013	2013	1			<b>selten gefunden</b>	16
Schlupfwespen-Art	Cratichneumon	flavifronsArt alt: fabricator	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Cratichneumon	coruscatorArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	GareilaG	nivataArt	2013	2016	1	1	<b>erster Fund in der Region</b>	<b>erst 3 Mal an nur 2 Orten gefunden</b> , det. M. Riedel	32
Schlupfwespen-Art	Ichneumon	bucculentusArt	2012	2013	2		Max. Ab2	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	EurylabusG	torvusArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden	08
Schlupfwespen-Art	Glyphicnemis	profligatorArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden	08
Schlupfwespen-Art	Plectocryptus	effeminatusArt	2013	2013	1		Ab1	<b>selten gefunden</b>	-
Schlupfwespengattung	PleolophusG Gattung		2013	2013	1		Ab1	Gattung wenig häufig gefunden	08
Schlupfwespen-Art	Agrothereutes	aterrimusArt	2013	2013	1		Ab1		16
Schlupfwespen Gattung	Mesostenus	funerisArt	2013	2013	1		Ab1	<b>selten gefunden</b>	16*
Schlupfwespen-Art	Ophion	scutellarisArt	2013	2013	1		Ab1	<b>selten gefunden</b>	16
Sichelwespen-Art	Therion	circumflexumArt	2014	2014		1	Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespen-Art	Campoletis	thomsoniArt	2013	2014	1	1	Max. Ab4	mässig häufig gefunden	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011	Beobachtungsgebiet			
Schlupfwespen-Art	Campoletis	"zonata"Art	2014	2014			1	Ab1	mässig häufig gefunden	-
Schlupfwespe Artkengruppe	Glypta	ceratitesKomplex	2014	1014			1	Ab1	wenig häufig gefunden	08
Schlupfwespen-Art	Glypta	caudataArt	2013	2013	1			Ab1	selten gefunden, unsicher bestimmt	64
Schwarze Schlupfwespe	Pimpla	rufipesArt	2013	2013	1			Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Dolichomitus	mesocentrusArt	2013	2013	2			Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	ColpotrochiaG	cinctaArt	2013	2013	1			Ab1	häufig gefunden	2
Schlupfwespen-Art	Exochus	septendrionalisArt	2013	2013	1			Ab1	<b>selten gefunden</b>	-
Schlupfwespen-Art	Exochus	argutusArt	2013	2013	1			<b>einzigster Fund in der Region</b>	<b>erst 1 Mal gefunden</b>	32
Schlupfwespen-Art	Rhorus	binotatusArt	2012	2012	1			Ab1	<b>selten gefunden</b>	16
Schlupfwespen-Art	Lagarotis	debitorArt	2017	2017			1	Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespengattung	PhobetesG Gattung		2013	2013	2			Max. Ab1	<b>Gattung selten gefunden</b>	16
Schlupfwespen-Art	Exenterus	ictericusArt	2013	2013	1			<b>einzigster Fund in der Region</b>	<b>erst 1 Mal gefunden</b>	64
Schlupfwespen-Art	Netelia	testaceaArt	2014	2014			1	Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Cosmoconus	meridionatorArt	2017	2017			1	Ab1	<b>selten gefunden</b>	16
Schlupfwespen-Art	Polyblastus	cothurnatusArt	2016	2016			1	Ab1	<b>erst 1 Mal gefunden</b>	64
Schlupfwespen-Art	Monoblastus	discedensArt	2013	2013	1			<b>einer von 2 Funden in der Region</b>	<b>erst 2 Mal gefunden</b>	16
Schlupfwespen-Art	Sussaba	erigatorArt	2013	2013	1			Ab1	mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Stephanus	serratorArt	2013	2013	1			Ab1	<b>selten gefunden</b>	16
Schmalbauchwespen-Art	Gasteruption	assectatorArt	2013	2013	1			Ab1	mässig häufig gefunden	4
Erzwespengattung	TorymusG Gattung		2013	2013	1			Ab1, <b>erster Fund in der Region</b>	Gattung erst 1 Mal gefunden, nicht beurteilt	64+
Ahorn-Gallwespe	PediaspisG	acerisArt	2013	2014	2		1	Max. Ab4	Gallen überall häufig, wo Bergahorn wächst	1

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Rollwespen-Art	Tiphia	unicolorArt alt: ruficornis	2013	2013	1		Ab1	<b>selten gefunden</b>	16
Schwarzgraue Wegameise	Lasius	nigerArt	2013	2021	1	5	Max. Ab3	sehr häufig gefunden in den Fallen der WSL sehr häufig: 1248 Individuen	1
Wegameisen-Art	Lasius	platythoraxArt	2013	2013	1		Ab3	mässig häufig gefunden	4
Grauschwarze Sklavenameise	Formica	fuscaArt	2016	2016		1	Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 236	2
Pillenwespen-Art	Eumenes	coronatusArt	2013	2019	2	1	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	2
Pillenwespen-Art	Eumenes	pedunculatusArt	2018			1	Ab1	wenig häufig gefunden	08
Lehmwespen-Art	Symmorphus	gracilisArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Haus-Feldwespe	Polistes	dominulusArt	2013	2019	5	6	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 23, nistet an Felsen und Mauern	1
Hornisse	VespaG	crabroArt	2013	2016	2	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Deutsche Wespe	Vespula	germanicaArt	2013	2013	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL mässig häufig: 83	1
Gemeine Wespe	Vespula	vulgarisArt	2013	2016	6	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL häufig: 359	1
Wegwespen-Art	Priocnemis	perturbatorArt	2013	2020	2	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 63	2
Wegwespen-Art	Priocnemis	hyalinataArt	2012	2012	1		Ab1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 4	08
Tönnchen-Wegwespe	Auplopus	carbonariusArt	2014	2014		1	Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 19	4
Wegwespen-Art	Arachnospila	ancepsArt	2012	2012	1		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Wegwespen-Art	Agenioideus	cinctellusArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 16	08
Frühlings-Wegwespe	Anoplius	viaticusArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Mexikanischer Heuschreckenjäger	IsodontiaG	mexicanaArt	2018	2018		1	Ab1	mässig häufig gefunden, erst seit wenigen Jahren in die Schweiz nördlich der Alpen	4
Bienenjagende Knotenwespe	Cerceris	rybiensisArt	2013	2019	3	4	Max. Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Sandknotenwespe	Cerceris	arenariaArt	2016		1		Ab1	wenig häufig gefunden	08
Knotenwespen-Art	Cerceris	quinquefasciataArt	2013	2021	1	2	Max. Ab2	wenig häufig gefunden	08

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	Beob- Beob-		1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob-	acht.	acht.	2001	2011				
Grabwespen-Art	Gorytes (s.str.)	quinquecinctusArt	2013	2016	2	1			Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Grabwespen-Art	Gorytes (s.str.)	fallaxArt	2013	2013	1				<b>1 von 2 Funden in der Region</b>	<b>erst 2 Mal gefunden</b> , Im Naturmuseum Solothurn ist 1 Tier deponiert (der Fundort ist mir	32
Grabwespen-Art	Argogorytes	mystaceusArt	2013	2016	1	1			Max. Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	4
Holzbohrwespen- oder Töpfergrabwespen-Art	Trypoxylon	minusArt	2013	2013	1				Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 36, nistet an Totholz	2
Grabwespen-Art	Pemphredon	lethiferaArt	2013	2013	1				Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4
Grabwespen-Art	Passaloecus	singularisArt alt: tenuis	2014	2014		1			Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 22	08
Grabwespen-Art	Ectemnius neu: Metacrabro	fossoriusArt	2019	2019		1			Ab1	<b>erst 1 Mal gefunden</b>	16
Grabwespen-Art	Ectemnius neu: Metacrabro	lituratusArt	2013	2013	1				Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2
Grabwespen-Art	Ectemnius neu: Clytochrysus	ruficornisArt alt: nigrifrons	2013	2013	1				Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	4
Grabwespen-Art	Ectemnius neu: Clytochrysus	lapidariusArt	2014	2014		1			Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Grabwespen-Art	Ectemnius neu: Hypocrabro	continuusArt	2013	2020	4	2			Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	2
Silbermundwespen-Art (Grabwespe)	Lestica	clypeataArt	2020	2020		1			Ab1	mässig häufig gefunden	2
Grabwespen-Art	Crossocerus (s.str.)	ovalisArt	2013	2013	1				Ab1	wenig häufig gefunden	08
Grabwespen-Art	Crossocerus (s.str.)	elongatulusArt	2013	2013	1				Ab1	<b>selten gefunden</b> , in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	16
Grabwespen-Art	Crossocerus neu: Coelocrabro	annulipesArt alt: ambiguus	2013	2013	1				Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 27	4
Grabwespen-Art	Crossocerus neu: Blepharipus	vagabundusArt	2013	2013	1				Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	08
Grabwespen-Art	Lindenius	albilabrisArt	2013	2013	1				Ab1	mässig häufig gefunden	4
Grabwespen-Art	Rhopalum	coarctatumArt	2013	2013	2				Max. Ab1	<b>selten gefunden</b> , in den Fallen der WSL selten: 3	16
Weissfleckige Fliegenspiesswespe (Grabwespe)	Oxybelus	uniglumisArt	2013	2013	1				Ab1	wenig häufig gefunden	08
Fliegenspiesswespen-Art (Grabwespe)	Oxybelus	bipunctatusArt	2013	2013	1				Ab2	mässig häufig gefunden	4
Fliegenspiesswespen-Art (Grabwespe)	Oxybelus	trispinosusArt	2013	2014	3	1			Max. Ab2	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Gewöhnliche Maskenbiene	Hylaeus	communisArt	2012	2019	3	4	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 26	2
Verkannte Maskenbiene	Hylaeus	confususArt	2013	2016	1	2	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 16	2
Gredlers Maskenbiene	Hylaeus	gredleriArt	2016	2016		1	Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 3	4
Rainfarn-Seidenbiene	Colletes	similisArt	2019	2019		1	Ab1	mässig häufig gefunden	4
Frühlings-Seidenbiene	Colletes	cuniculariusArt	2014	2014		1	Ab1	mässig häufig gefunden, in Ausbreitung begriffen	4
Efeu-Seidenbiene	Colletes	hederaeArt	2013	2019	1	2	Max. Ab2	die erst 1993 neu beschriebene Art ist in der Schweiz erst seit wenigen Jahren bekannt	4
Rotbeinige Furchenbiene	Halictus	rubicundusArt	2013	2017	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 8	2
Gelbbindige Furchenbiene	Halictus	scabiosaeArt	2013	2016	1	1	Max. Ab2	die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", derzeit ist sie häufig	1
Dichtpunktierte Goldfurchenbiene	Halictus	subauratusArt	2019	2019		1	Ab1	<b>wenig häufig und nur an wenigen Orten gefunden</b>	4
Gewöhnliche Goldfurchenbiene	Halictus	tumulorumArt	2013	2013	1		Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL wenig häufig: 29	1
Weissbinden-Schmalbiene	Lasioglossum	leucozoniumArt	2013	2013	3		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Breitbindige Schmalbiene	Lasioglossum	zonulumArt	2013	2016	1	3	Max. Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 5	2
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatumArt	2012	2021	8	4	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 50	1
Weissbeinige Schmalbienen	Lasioglossum	albipesArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	laticepsArt	2013	2013	1		Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL sehr häufig: 616	1
Dickkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	glabriusculumA	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden	2
Polierte Schmalbiene	Lasioglossum	politumArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum	villosulumArt	2013	2013	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Rotfuss-Schmalbiene	Lasioglossum	rufitarseArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden	08
Dunkelgrüne Schmalbiene	Lasioglossum	morioArt	2013	2016	3	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 93	1
Dickkopf-Blutbiene	Sphecodes	monilicornisArt	2016	2016		1	Ab1	mässig häufig gefunden	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Leistenkopf-Blutbiene	Sphecodes	scabricollisArt	2012	2017	2	1	Max. Ab2	mässig häufig gefunden, hat in den letzten Jahren zugenommen	4
Riesen-Blutbiene	Sphecodes	albilabrisArt	2016	2016		1	Ab1	wenig häufig gefunden, aber in letzter Zeit häufiger geworden	08
Gewöhnliche Blutbiene	Sphecodes	ephippiusArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	2
Punktierte Blutbiene	Sphecodes	puncticepsArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL selten: 5	4
Durchscheinende Blutbiene	Sphecodes	hyalinatusArt	2013	2013	1		Ab2	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL nur 2 Individuen	4
Glanzlose Zergsandbiene	Andrena	subopacaArt	2013	2014	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 24	2
Gewöhnliche Zergsandbiene	Andrena	minutulaArt	2013	2020	5	4	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	2
Rotschopfige Sandbiene	Andrena	haemorrhoeaArt	2013	2017	1	2	Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 234	2
Rotbeinige Rippensandbiene	Andrena	tibialisArt	2020	2020		1	Ab1	<b>selten gefunden</b>	16*
Glänzende Düstersandbiene	Andrena	nitidaArt	2013	2014	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 129	2
Schlehen-Lockensandbiene	Andrena	helvolaArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 427	4
Zweifarbige Sandbiene	Andrena	bicolorArt	2013	2014	3	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 21	2
Gewöhnliche Dörnchensandbiene	Andrena	humilisArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	2
Ovale Klee-Sandbiene	Andrena	ovatulaArt	2013	2013	2		Max. Ab1	häufig gefunden	2
Zwerg-Düsterbiene	Stelis	minutaArt	2016	2016		1	Ab1		64
Gewöhnliche Löcherbiene	Heriades	truncorumArt	2013	2013	2		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 15	2
Hahnenfuss-Scherenbiene	Chelostoma	florisomneArt	2013	2013	4		Max. Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 28	2
Rote Mauerbiene	Osmia	rufaArt neu: bicornis	2020	2020		1	Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11, oft an Nisthilfen	2
Zweifarbige Schneckenhausbiene	Osmia	bicolorArt	2013	2014	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Mai-Langhornbiene	Eucera	nigrescensArt alt: tuberculata	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Schnauzen-Wespenbiene	Nomada	sexfasciataArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011	Beobachtungsgebiet			
Feld-Wespenbiene	Nomada	goodenianaArt neu: succincta	2014	2018		2	Max. Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	2
Stachelbeer-Wespenbiene	Nomada	signataArt	2014	2014		1	Ab1		wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	08
Gelbe Wespenbiene	Nomada	flavaArt	2013	2013	2		Max. Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	2
Panzers Wespenbiene	Nomada	panzeriArt	2013	2017	1	2	Max. Ab1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 20	4
Rothaarige Wespenbiene	Nomada	lathburianaArt	2017	2017		1	Ab1		wenig häufig gefunden, in letzter Zeit häufiger geworden	08
Rotfühler- oder Gespaltene Wespenbiene	Nomada	ruficornisArt alt: bifida	2013	2013	1		Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Rotbäuchige Wespenbiene	Nomada	bifasciataArt lepeletieri Unterart	2013	2013	1		Ab1		häufig gefunden	2
Gelbfleckige Wespenbiene	Nomada	flavoguttataArt	2013	2017	5	2	Max. Ab2		häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	2
Weissfleckige Wespenbiene	Nomada	alboguttataArt	2013	2017	3	1	Max. Ab1		<b>selten gefunden</b>	16
Ehrenpreis-Wespenbiene	Nomada	atroscutellarisArt	2013	2013	1		Ab1		mässig häufig gefunden	4
Dunkle Erdhummel	Bombus	terrestrisArt	2013	2020	3	7	Max. Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 71	1
Helle Erdhummel	Bombus	lucorumArt	2013	2020	2	1	Max. Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 262	1
Baumhummel	Bombus	hypnorumArt	2013	2013	2		Max. Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	2
Steinhummel	Bombus	lapidariusArt	2013	2016	2	2	Max. Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 9	1
Ackerhummel	Bombus	pascuorumArt	2012	2020	10	5	Max. Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 96	1
Veränderliche Hummel	Bombus	humilisArt	2013	2013	2		Max. Ab1		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Gartenhummel	Bombus	hortorumArt	2013	2019	6	2	Max. Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 14	1
Bärtige Kuckuckshummel (der Gartenhummel)	Psithyrus alt und neu: Bombus	barbutellusArt	2013	2013	1		Ab1		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 3	1
Böhmische Kuckuckshummel (der Hellen Erdhummel)	Psithyrus alt und neu: Bombus	bohemicusArt	2014	2019		2	Max. Ab1		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 11	1
Feld-Kuckuckshummel (der Ackerhummel)	Psithyrus alt und neu: Bombus	campestrisArt	2012	2019	2	1	Max. Ab1		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	1
Rotschwarze oder Felsen-Kuckuckshummel	Psithyrus alt und neu:	rupestrisArt	2013	2020	2	1	Max. Ab1		häufig gefunden	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002			Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011				
Gefleckte oder Keusche Kuckuckshummel (der Dunklen)	Psithyrus alt und neu:	vestalisArt	2020	2020			1	Ab1	mässig häufig gefunden, hat in den letzten Jahren zugenommen	4
Wald-Kuckuckshummel (der Wiesenhummel)	Psithyrus alt und neu:	sylvestrisArt	2013	2013	1			Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 19	1
Honigbiene	ApisG	melliferaArt	2012	2013	11	13		Max. Ab5	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 489	1
<b>SCHMETTERLINGE</b>	<b>Lepidoptera</b>	<b>Ordnung</b>								
Langfühlermotten-Art	Nematopogon	adansoniellaArt	2016	2016			1	Ab1	mässig häufig gefunden	4
Grüne Langfühlermotte	AdelaG	reaumurellaArt	2013	2013	2			Max. Ab1	häufig gefunden	2
Langfühlermotten-Art	Adela	croesellaArt	2013	2013	1			Ab1	wenig häufig gefunden	08
Langfühlermotten-Art	Cauchas	rufimitrellaArt	2013	2013	1			Ab1	häufig gefunden	2
Schwarzdorn-Gespinstmotte	Yponomeuta	padellaArt	2013	2013	1			Ab1	mässig häufig gefunden	-
Gespinstmotten-Art	Yponomeuta	plumbellaArt	2013	2013	1			Ab1	wenig häufig gefunden	08
Wickler-Art	AgapetaG	hamanaArt	2013	2018	1	1		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	EpagogeG	grocianaArt	2013	2013	1			Ab1	<b>selten gefunden</b>	16
Wickler-Art	OlethreutesG	arcuellaArt	2013	2016	3	2		Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Wickler-Art	Celypha	strianaArt	2020	2020			1	Ab1	häufig gefunden	2
Wickler-Art	Celypha	lacunanaArt	2013	2014	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Wickler-Art	Rhopobota alt: Griselda	stagnanaArt	2014	2014			1	Ab1	mässig häufig gefunden	4
Brombeertriebwickler	Notocelia alt: Epiblema	uddmannianaArt	2020	2020			1	Ab1	<b>selten gefunden</b>	16*
Wickler-Art	Cydia	fagiglandanaArt	2013	2013	1			Ab1	wenig häufig gefunden	08
Flammenzünsler	EndotrichiaG	flammealisArt	2013	2013	1			Ab1	wenig häufig gefunden	08
Fruchtzünsler-Art	OncoceraG	semirubellaArt	2017	2019			3	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Rispengraszünsler	ChrysoteuchiaG	culmellaArt	2013	2018	1	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellusArt	2013	2020	2	5	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Weisser Graszünsler	Crambus	perlellaArt	2013	2016	1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	AgriphilaG	tristellaArt	2013	2013	1		Ab1	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatellaArt	2013	2021	2	5	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminellaArt	2013	2017	1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Microstega	pandalisArt	2013	2013	1		Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Maiszünsler	OstriniaG	nubilalisArt	2013	2019	1	2	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4
Wanderzünsler	NomophilaG	noctuellaArt	2012	2012	1		Ab3	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden	1
Buchsbaum-Zünsler	CydalimaG alt: Diaphania	perspectalisArt	2012	2012	1		Ab1	bis jetzt noch mässig häufig gefunden, Neozoon, breitet sich seit wenigen Jahren aus	4
Hummelschwärmer	Hemaris	fuciformisArt	2014	2014		1	Ab1	eigene Funde wenig häufig, R.Bas.: 14, 20	08
Taubenschwänzchen	MacroglossumG	stellatarumArt	2013	2013	3		Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 26, 114	1
Nagelfleck	AgriaG	tauArt	2013	2014	1	1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 17, 49	1
Mattfleckiger Kommafalter	OchlodesG	venataArt	2013	2019	3	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1
Schwalbenschwanz	PapilioG	machaonArt	2013	2013	1		Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 340	1
Weissling nicht bestimmt	(Pieridae) Familie	non det.	2012	2021	12	17	Max. Ab3	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	1
Tintenfleckweissling Artengruppe	LeptideaG	sinapis-Komplex	2013	2019	1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Grosser Kohlweissling	PierisG	brassicaeArt	2013	2013	4		Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482	1
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapaeArt	2012	2020	5	4	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napiArt	2012	2020	9	3	Max. Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1
Aurorafalter	AnthocarisG	cardaminesArt	2013	2013	1		Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1
Postillon, Wandergelbling, Achter	Colias	croceaArt	2013	2013	2		Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 35, 117	1

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Zitronenfalter	GonepteryxG	rhamniArt	2013	2018	4	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1
Tagpfauenauge	InachisG	ioArt	2012	2014	6	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1
Admiral	VanessaG	atalantaArt	2012	2016	2	2	Max. Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	1
Kleiner Fuchs	AglaisG	urticaeArt	2013	2020	1	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
C-Falter	PolygoniaG	c-albumArt	2012	2020	3	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185	1
Landkärtchen	AraschniaG	levanaArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 39, 261	2
Perlmutterfaltergattung	ArgynnisG Gattung		2018	2018		1	Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Kaisermantel	Argynnis	paphiaArt	2013	2021	4	6	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 531	1
Schachbrettfalter	MelanargiaG	galatheaArt	2013	2020	1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	ManiolaG	jurtinaArt	2014	2021		9	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Brauner Waldvogel	AphantopusG	hyperantusArt	2013	2019	3	4	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilusArt	2013	2021	1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1
Waldbrettspiel, Laubfalter	ParargeG	aegeriaArt	2013	2021	5	1	Max. Ab2	im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688	1
Mauerfuchs	LasiommataG	megeraArt	2012	2013	1		Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1
Nierenfleck, Birken-Zipfelfalter	TheclaG	betulaeArt	2013		3		Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 23, 68	2
Ulmen-Zipfelfalter	Satyrium	w-albumArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 17, 42	4
Südlicher Kurzschwänziger Bläuling	Cupido alt: Cyaniris	alcetasArt	2019	2019		1	Ab1	<b>selten gefunden, erst seit kurzem in der Schweiz nördlich der Alpen</b>	2
Faulbaum-Bläuling	CelastrinaG	argiolusArt	2013	2019	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 28, 82	2
Kleiner Sonnenröschen-Bläuling	AriciaG	agestisArt	2016	2019		2	Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 27, 250	2
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarusArt	2018	2021		3	Yb1	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1
Eckflügel- Kleinspanner	Scopula	nigropunctataArt	2013	2019	1	1	Max. Ab1	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 8	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Vierpunkt-Kleinspanner	Scopula	immutataArt	2013	2017	1	1	Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 17, 18	2
Ampferspanner	TimandraG alt: Calothysanis	comaeArt alt: griseata	2013		3		Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 9, 7	2
Spanner-Art	Epirrhoe	alternataArt	2013	2013	1		Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 69	1
Löwenzahnspanner	CamptogrammaG	bilineataArt	2012	2014	1	1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270	1
Spanner-Art	Colostygia	pectinatariaArt	2013	2013	1		Ab1	am Tag erst 6 schlafende Falter und 3 Falter am Licht gefunden, R.Bas.: 18, 40	08
Spanner-Art	AsthenaG	albulataArt	2017	2017		1	Ab1	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 14, 21	4
Mausspanner	MinoaG	murinataArt	2013	2021	1	4	Max. Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 41	2
Zackensaum-Heidelbeerspanner	CepphisG	advenariaArt	2013	2017	1	2	Max. Ab1	<b>am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 3, 1</b>	08
Zweifleck-Weissspanner	Lomographa	bimaculataArt	2017	2017		1	Ab1	am Tag nur selten gefunden, R.Bas.: 14, 34	4
Perlglanzspanner	CampaeaG	margaritataArt	2013	2013	1		Ab1	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 26, 132	2
Palpeneulen-Art	Herminia	tarsicrinalisArt	2013	2013	1		Ab1	am Tag erst 11 Falter gefunden, R.Bas.: 9, 19	08
Seideneulchen	RivulaG	sericealisArt	2012	2016	4	1	Max. Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 22, 104	1
Eulenfalter-Art	Macdunnoughia G	confusaArt	2016	2016		1	Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 16	2
Gammaeule	AutographaG	gammaArt	2013	2020	5	1	Max. Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1
Eulenfalter-Art	ProtodeltodeG alt: Lithacodia	pygargaArt	2014	2014		1	Ab1	am Tag wenig 10 Falter gefunden, R.Bas.: 16, 37	08
Weissfleckige Schilfgraseule	Mythimna	albipunctaArt	2020	2020		1	Ab1	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 21, 81	4
<b>SCHNABELFLIEGEN</b>	<b>Mecoptera Ordnung</b>								
Skorpionsfliegen-Art	Panorpa	cognataArt	2013	2018	6	2	Max. Ab2	wenig häufig gefunden	08
Deutsche Skorpionsfliege	Panorpa	germanicaArt	2012	2018	9	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden	1
Gewöhnliche Skorpionsfliege	Panorpa	communisArt	2013	2018	8	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Gemeine Skorpionsfliege	Panorpa	vulgarisArt	2012	2014	6	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	1990 – 2001	2002–2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
<b>ZWEIFLÜGER</b>	<b>Diptera</b> Ordnung								
Gemeine Wiesenschnake	Tipula s.str.	U.g. Tipula paludosaArt	2013	2013	2		Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Schnaken-Art	Tipula Pterelachisus	U.g. pabulinaArt	2013	2013	1		Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Schnaken-Art	<b>Tipula</b> U.g. Vestiplex	hortorumArt	2013	2013	1		Ab1	<b>selten gefunden</b>	16*
Schnaken-Art	<b>Tipula</b> U.g. Lunatipula	lunataArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Frühlingschnake	Tipula U.g. Lunatipula	vernalisArt	2013	2013	1		Ab1	sehr häufig gefunden	1
Gefleckte Krähenschnake	Nephrotoma	appendiculataArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden	2
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	cornicinaArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden	2
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	crocataArt	2013	2013	4		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	08
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	dorsalisArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Krähenschnaken-Art	Nephrotoma	scurraArt	2019	2019		1	Ab1	wenig häufig gefunden, vor allem in Kiesgruben	08*
Stelzmücken-Art	Limonia	nigropunctataArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
<b>Stechmücken Familie</b>	<b>(CulicidaeF)</b> Familie		2013	2021	5	5	Max. Ab5	Familie häufig gefunden, aber nicht inventarisiert	4
Kriebelmücken Familie	(SimuliidaeF) Familie		2013	2017	1	4	Max. Ab.2	sehr häufig gefunden	1
Buchenblatt-Gallmücke	MikiolaG	fagiArt (Gallen)	2013	2020	5	2	Max. Ab4	Gallen häufig registriert, sehr häufig nicht registriert	1
Johannismücke	Bibio	johannisArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2
Haarmücken-Art	Bibio	reticulatusArt	2013	2013	1		Ab1	<b>selten gefunden</b>	16*
Waffenfliegen-Art	ChloromyiaG	formosaArt	2013	2020	1	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Waffenfliegen-Art	Sargus	cuprariusArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden	08
Regenbremse	HaematopotaG alt: Chrysozona	pluvialisArt	2013	2013	1		Ab1	sehr häufig gefunden	1
Fransen-Mordfliege	Choerades	fimbriataArt	2013	2013	4		Max. Ab2	häufig gefunden	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Barbarossa-Fliege	EutolmusG	rufibarbisArt	2013	2019	1	2	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	2
Gemeine Raubfliege	TolmerusG	atricapillusArt	2013	2019	2	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden	1
Gemeiner Strauchdieb	Neoitamus	cyanurusArt	2013	2013	2		Max. Ab1	wenig häufig gefunden	08
Grosser Wollschweber	Bombylius	majorArt	2013	2020	4	5	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Tanzfliegen-Art	Empis	nigripesArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden	08
Tanzfliegen-Art	Empis	tesselataArt	2019	2019		1	Ab1	sehr häufig gefunden	1
Tanzfliegen-Art	Empis	lividaArt	2013	2013	1		Ab1	sehr häufig gefunden	1
Kurze oder Bogenader-Feldschwebefliege	Eupeodes	lapponicusArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden, die Häufigkeit schwankt von Jahr zu Jahr stark	2
Gemeine Winter- oder Parkschwebefliege	EpisyrphusG	balteatusArt	2012	2020	5	1	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 200	1
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebefliege	Sphaerophoria	scriptaArt	2013	2020	4	4	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Grosse Schwebefliege, Gemeine Gartenschwebefliege	Syrphus	ribesiiArt	2013	2013	2		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 13	1
Behaarte Schwebefliege, Grosse Gartenschwebefliege	Syrphus	torvusArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 7	2
Kleine Gartenschwebefliege	Syrphus	vitripennisArt	2013	2020	1	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Frühe Gelbrandschwebefliege	Xanthogramma	festivumArt	2020	2020		1	Ab1	mässig häufig gefunden	4
Späte Gelbrandschwebefliege	Xanthogramma	pedissequumA	2014	206		2	Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Zweiband-Wespenschwebefliege	Chrysotoxum	bicinctumArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	2
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebefliege	Melanostoma	mellinumArt	2013	2020	2	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 58	1
Matte Schwarzkopfschwebefliege, Lange Grasschwebefliege	Melanostoma	scalareArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 34	2
Gemeine Breitfusschwebefliege	Platycheirus	clypeatusArt	2013	2013	1		Ab1	häufig gefunden	2
Weissstirnige Heideschwebefliege	Paragus	albifronsArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden	-
Silbrige Heideschwebefliege	Paragus	majoranaeArt neu: pecchiolinii	2013	2016	1	1	Max. Ab1	mässig häufig gefunden	4

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Gemeine Zwergschwebefliege	Pipizella	viduataArt	2013	2019	2	2	Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	1
Gemeine oder Lange Erzswebefliege Variabilis-Gruppe	Cheilosia	variabilisArt	2013	2014	1	1	Max. Ab1	häufig gefunden	2
Pilz-Erzswebefliege Pagana-Gruppe	Cheilosia	scutellataArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Weiden-Erzswebefliege Canicularis-Gruppe	Cheilosia	albipilaArt	2017	2017		1		wenig häufig gefunden	08
Erzswebefliegen-Art Proxima-Gruppe	Cheilosia	aereaArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden	08
Frühlings- oder Aster-Erzswebefliege Bergenst.-Gr.	Cheilosia	vernalisArt	2012	2013	1		Ab2	häufig gefunden	2
Gemeine Schnauzenschwebefliege, Feld-Schnabelschwebefliege	Rhingia	campestrisArt	2013	2013	4		Max. Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 5	1
Schnauzenschwebefliegen-Art	Rhingia	rostrataArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	08
Grosskopf-Zwiebelschwebefliege	Eumerus	ornatusArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 12	4
Kleine Bienenschwebefliege	Eristalis	arbustorumArt	2013	2019	1	1	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	1
Keilfleckschwebefliegen-Art	Eristalis	interruptaArt	2012	2019	6	3	Max. Ab2	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Gemeine Keilfleckschwebefliege Lange Bienenschwebefliege	Eristalis	pertinaxArt	2013	2021	6	2	Max. Ab2	sehr häufig gefunden	1
Schwarze Bienenschwebefliege	Eristalis	pratorumArt	2013	2013	1		Ab1	mässig häufig gefunden	4
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis	tenaxArt	2012	2021	7	8	Max. Ab5	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL mässig häufig: 57	1
Sumpfschwebefliegengattung	HelophilusG Gattung		2021	2021		1	Ab1	Gattung häufig gefunden	2
Gemeine Sumpfschwebefliege, Gemeine Sonnenschwebefliege	Helophilus	pendulusArt	2013	2013	1		Max. Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 8	2
Totenkopfschwebefliege	MyathropaG	floreaArt	2012	2019	10	2	Max. Ab3	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 18	1
Goldbandschwebefliege	CaliprobolaG	speciosaArt	2013	2014	1	1	Max. Ab2	mässig häufig gefunden	4
Schmale Hummelschwebefliege, Bienen-Pelzschwebefliege	CriorhinaG	asilicaArt	2020	2020		1		wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 2 Individuen	08*
Kleine "Mistbiene", Gemeine Keulen- oder Mistschwebefliege	SyrittaG	pipiensArt	2013	2013	1		Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 4	1
Hummel-Moderholzschwebefliege	Temnostoma	bombylansArt	2013	2013	1		Ab1	wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL nur 1 Individuum	08

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011	Beobachtungsgebiet			
Schwarzfuss- Langbauchschwebefliege	Brachypalpoidea G	lentusArt	2013	2013	1		Ab1		wenig häufig gefunden, in den Fallen der WSL selten: 6	08
Gemeine Langbauchschwebefliege Gemeine Holzschwebefliege	Xylota	segnisArt	2012	2012	1		Ab1		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL häufig: 160	1
Goldhaarschwebefliege oder Langbauchschwebefliege	Xylota	sylvarumArt	2018	2018		1	Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL wenig häufig: 19	2
Dickkopffliegen-Art	Myopa	buccataArt	2013	2013	1		Ab1		mässig häufig gefunden	4
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	atraArt	2016	2016		1	Ab1		unsicher bestimmt	2
Schwingfliegengattung	SepsisG Gattung		2017	2017		1	Ab1		Gattung häufig gesehen, aber meist nicht registriert	4
Netzfliegen-Art	TrypetopteraG	punctulataArt	2013	2019	1	2	Max. Ab1		mässig häufig gefunden	4
Netzfliegen-Art	Euthycera	fumigataArt	2013	2013	1		Ab1		wenig häufig gefunden	08
Kotfliegen-Art	Scatophaga	stercorariaArt	2013	2017	2	2	Max. Ab1		sehr häufig gefunden, aber oft nicht registriert	1
Herbst-Stubenfliege	MuscaG	autumnalisArt	2013	2018	3	2	Max. Ab4		sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	1
Hirschlausfliege	LipoptenaG	cerviArt	2012	2017	2	2	Max. Ab2		mässig häufig gefunden	4
Schmeissfliegengattung	PolleniaG Gattung		2012	2017	4	5	Max. Ab1		Gattung sehr häufig gefunden	1
Fleischfliegengattung	SarcophagaG Gattung		2013	2016	12	2	Max. Ab3		Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1
Raupenfliegen-Art	Tachina alt: Echinomyia	feraArt	2013	2019	2	3	Max. Ab2		häufig gefunden, aber oft nicht registriert	2
Raupenfliegen-Art	Tachina alt: Echinomyia	magnicornisArt	2016	2017		2			häufig gefunden	2
Raupenfliegen-Art	Nowickia	feroxArt	2019	2019		1	Ab1		mässig häufig gefunden	4*
Raupenfliegen-Art	DexiosomaG	caninumArt	2013	2013	1		Max. Ab1		wenig häufig gefunden, aber vermutlich oft übersehen	4
Raupenfliegen-Art	EriothrixG	rufomaculataArt	2017	2019		2			häufig gefunden	1
Raupenfliegengattung	GymnosomaG Gattung		2013		1				Gattung sehr häufig gefunden	1
Raupenfliegen-Art	Phasia	obesaArt	2012	2012	1		Ab1		wenig häufig gefunden	08
Raupenfliegen-Art	EctophasiaG	crassipennisArt	2018	2019		2	Max. Ab1		häufig gefunden	2

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im		Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011	Beobachtungsgebiet			
Raupenfliegengattung	CylindromyiaG Gattung		2017	2017		1	Ab1		Gattung häufig gefunden, mehrere für uns nicht unterscheidbare Arten, daher nur selten	08
Raupenfliegen-Art	Cylindromyia alt: Ocyptera	brassicariaArt	2013	2013	1		Ab1		unsicher bestimmt	2
<b>WIRBELTIERE</b>	<b>VERTEBRAT A STAMM</b>									
Eidechse nicht bestimmt	Lacerta cf. Podarcis	non det.	2013	2020	1	1	Max. Ab1		sehr häufig gefunden	1
Mauereidechse	PodarcisG	muralisArt	2013	2016	4	4	Max. Ab1		sehr häufig gefunden	1
Kuckuck	CuculusG	canorusArt	2016	2016		1	Ab1		früher häufig gehört, aber in letzter Zeit <b>selten geworden</b>	4
Grünspecht	Picus	viridisArt	2013	2020	2	6	Max. Ab1		sehr häufig beobachtet	1
Schwarzspecht	DryocopusG	martiusArt	2020	2020		1	Ab1		sehr häufig beobachtet	1
Misteldrossel	Turdus	viscivorusArt	2013	2013	1		Ab1		sehr häufig beobachtet	1
Gartengrasmücke	Sylvia	borinArt	2013	2019	2	3	Max. Ab1		häufig beobachtet	2
Schwanzmeise	AegitalusG	caudatusArt	2014	2014		1	Ab1		häufig beobachtet	2
Waldbaumläufer	CerthiaG	familiarisArt	2013	2013	1		Ab1		häufig beobachtet	2
Gartenbaumläufer	Certhia	brachydactylaArt	2012	2019	5	2	Max. Ab2		sehr häufig beobachtet	1
Pirol	OriolusG	oriolusArt	2013	2013	1		Ab1		wenig häufig beobachtet	08
Kolkrabe	Corvus	coraxArt	2012	2020	1	1	Max. Ab1		sehr häufig beobachtet	1
Stieglitz, Distelfink	Carduelis	carduelisArt	2013	2013	4		Max. Ab2		häufig beobachtet	2
Goldammer	EmberizaG	citrinellaArt	2013	2018	4	4	Max. Ab1		sehr häufig beobachtet	1
Edel- oder Baummarder	Martes	martesArt	2013	2013	1		Ab1		erst 1 Mal ein lebendes Tier beobachtet und selten Spuren (Losung)	16
Reh	CapreolusG	capreolusArt	2013	2020	4	5	Max. Ab1		häufig beobachtet und auch anhand der Spuren festgestellt	1
<b>MOOSE</b>	<b>BRYOPHYTA ABTEILUNG</b>								Hauptsächlich Arten der Halbtrockenrassen sind registriert	
Erd-Bartmoos	Tortula alt: Syntrichia	ruralisArt	2017						sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Drehmoos	FunariaG	hygrometricaArt	2013				Ab2	mässig viele Fundorte	
<b>FARNPFLANZEN</b>	<b>PTERIDOPHYT A ABTEILUNG</b>								
Echter Wurmfarne	Dryopteris	filix-masArt	2013				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
<b>SAMENPFLANZEN</b>	<b>SPERMATOPHYT TA ABTEILUNG</b>							Die meisten Bäume, Sträucher, Gräser und andere, sehr häufige Pflanzen fehlen	
Gewöhnliche Akelei	AquilegiaG	vulgarisArt	2013				Ab2	viele Fundorte	
Hahnenfussähnliches Windröschen	Anemone	ranunculoidesArt	2016					wenig Fundorte	
Busch-Windröschen	Anemone	nemorosaArt	2013				Ab4	sehr viele Fundorte	
Wolliger Hahnenfuss	Ranunculus	lanuginosusArt	2013				Ab2	mässig viele Fundorte	
Kriechender Hahnenfuss	Ranunculus	repensArt	2013				Ab1	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Sauerdorn	Berberis	vulgarisArt	2013				Ab1	mässig viele Fundorte	
Klatsch-Mohn	Papaver	rhoeasArt	2013				Ab2	mässig viele Fundorte	
Mohngattung	PapaverG Gattung		2013				Ab2	(sehr zart, 4 schmale Kronblätter, Narbe 4-zählig, 9 Staubblätter) 1 Grubenrand	
Schwarznußbaum	JuglansG	nigraArt	2016						
Gewöhnliche Nelkenwurz	Geum	urbanumArt	2013				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Traubenkirsche Unterart	Prunus	padusArt padusUnterart	2013				Ab4	viele Fundorte	
Hopfenklee	Medicago	lupulinaArt	2013				Ab2	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Kriechender Klee	Trifolium	repensArt	2013				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Robinie, Falsche Akazie	RobiniaG	pseudacaciaArt	2012				Ab4	Neophyt, mässig viele Fundorte	
Schopfiger Hufeisenklee	HippocrepisG	comosaArt	2013				Ab2	viele Fundorte	
Blut-Weiderich	LythrumG	salicariaArt	2013				Ab1	viele Fundorte	
Lamarcks Nachtkerze	Oenothera	glazovianaArt alt: erythrosepala	2012				Ab4	mässig viele Fundorte	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
				2001	2011			
Lamarcks Nachtkerze	Oenothera glazovianaArt alt: erythrosepala	2013				Ab2	mässig viele Fundorte	
Essigbaum	RhusG typhinaArt	2014					Neophyt, wenig Fundorte	
Aufrechter Sauerklee	Oxalis fontanaArt alt: stricta	2012				Ab2	viele Fundorte, aber nur mässig oft registriert	
Drüsentragendes Springkraut	ImpatiensG glanduliferaArt	2012				Ab2	Neophyt, mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	
Kleinblütiges Springkraut	Impatiens parvifloraArt	2013				Ab4	im Wald sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert	
Kornelkirsche	Cornus masArt	2013				Ab3	wenig Fundorte, dann aus Gärten verwildert	
Wald-Borstendolde	Torilis japonicaArt	2013				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Purgier-Kreuzdorn	RhamnusG catharticaArt	2013				Ab1	viele Fundorte	
Aufrechte Wolfsmilch	Euphorbia strictaArt	2013				Ab1	mässig viele Fundorte	
Zypressen-Wolfsmilch	Euphorbia cyparissiasArt	2013				Ab3	viele Fundorte	
Mannsblut	HypericumG androsaemumArt	2016						
Echtes Johanniskraut	Hypericum perforatumArt	2012				Ab2	sehr viele Fundorte	
Rauhhaariges Veilchen	Viola hirtaArt	2016					sehr viele Fundorte	
Wald-Veilchen	Viola reichenbachianaArt alt: sylvestris	2013				Ab5	viele Fundorte	
Knoblauchhederich, Lauchkraut	AlliariaG petiolataArt	2013				Ab2	viele Fundorte	
Wald-Schaumkraut	Cardamine flexuosaArt	2013				Ab1	wenig Fundorte	
Silberpappel	Populus albaArt	2013				Ab3	mässig viele Fundorte, aber nur selten registriert	
Primel, Stengellose Schlüsselblume	PrimulaG vulgarisArt	2013				Ab2	mässig viele Fundorte, aus Gärten verwildert	
Rote Waldnelke	Silene dioecaArt	2013				Ab1	viele Fundorte	
Echtes Tausenguldenkraut	CentauriumG erythraeaArt	2013				Ab2	mässig viele Fundorte	
Waldmeister	Galium odoratumArt	2013				Ab3	viele Fundorte	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
				2001	2011			
Kletten-Labkraut	Galium aparineArt	2013				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert	
Wald-Vergissmeinnicht	Myosotis sylvaticaArt	2013				Ab2	viele Fundorte	
Acker-Vergissmeinnicht	Myosotis arvensisArt	2013				Ab2	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Dunkelgrünes Lungenkraut	PulmonariaG obscuraArt	2013				Ab2	viele Fundorte, aber oft nicht inventarisiert	
Bittersüss	Solanum dulcamaraArt	2013				Ab2	wenig Fundorte	
Schwarzer Nachtschatten	Solanum nigrumArt	2012				Ab1	wenig Fundorte	
Sommerflieder	BuddlejaG davidiiArt	2013				Ab3	Neophyt, mässig viele Fundorte	
Kleinblütige Königskerze	Verbascum thapsusArt	2012				Ab2	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Knotige Braunwurz	Scrophularia nodosaArt	2013				Ab2	viele Fundorte	
Gewöhnliches Leinkraut	LinariaG vulgarisArt	2012				Ab2	viele Fundorte	
Kriechender Günsel	Ajuga reptansArt	2013				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Gundelrebe	GlechomaG hederaceaArt	2013				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Berg-Goldnessel Unterart	Lamium alt: Lamiastrum galeoptolonArt montanumUnterart	2013				Ab4	viele Fundorte	
Wald-Ziest	Stachys sylvaticaArt	2013				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Wasser-Minze	Mentha aquaticaArt	2017					in Feuchtlebensräumen, mässig viele Fundorte	
Wasserdost	EupatoriumG cannabinumArt	2013				Ab3	viele Fundorte	
Kanadische Goldrute	Solidago canadensisArt	2012				Ab2	mässig viele Fundorte	
Späte Goldrute	Solidago giganteaArt	2013				Ab4	mässig viele Fundorte	
Ausdauerndes Gänseblümchen	BellisG perenniArt	2013				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Kanadisches Berufkraut	ConyzaG canadensisArt	2012				Ab2	wenig Fundorte	
Einjähriges Berufkraut Unterart	Erigeron annuusArt annuusUnterart	2013				Ab2	mässig viele Fundorte , aber lokal oft sehr häufig, meist nicht inventarisiert	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Rudbeckiangattung	RudbeckiaG Gattung		2013				Ab2	Gattung nur drei Fundorte in der Natur	
Huflattich	TussilagoG	farfaraArt	2012				Ab2	viele Fundorte	
Raukenblättriges Kreuzkraut	Senecio	erucifoliusArt	2013				Ab2	viele Fundorte	
Jakobs-Kreuzkraut	Senecio	jacobaeaArt	2013				Ab2	viele Fundorte	
Grosse Klette	Arctium	lappaArt	2012				Ab3	wenig Fundorte	
Krause Distel	Carduus	crispusArt	2013				Ab4	wenig Fundorte	
Gewöhnliche Kratzdistel	CirsiumG	vulgareArt	2013				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Acker-Kratzdistel	Cirsium	arvenseArt	2013				Ab4	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Sumpf-Kratzdistel	Cirsium	palustreArt	2013				Ab1	viele Fundorte	
Wiesen-Ferkelkraut	HypochoerisG	radicataArt	2012				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Östlicher Wiesen-Bocksbart	Tragopogon	orientalisArt	2013				Ab2	viele Fundorte	
Mauerlattich	MycelisG	muralisArt	2013				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Kohl-Gänsedistel	SonchusG	oleraceusArt	2013				Ab1	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Rauhe Gänsedistel	Sonchus	asperArt	2013				Ab2	viele Fundorte, aber wenig häufig registriert	
Zweijähriger Pippau	Crepis	biennisArt	2013				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Doldiger Milchstern	OrnithogalumG	umbellatumArt	2013				Ab2	mässig viele Fundorte	
Traubige Bisamhyazinthe	Muscari	racemosumArt	2013				Ab1	mässig viele Fundorte	
Vielblütige Weisswurz	Polygonatum	multiflorumArt	2012				Ab2	im Wald viele Fundorte	
Vierblättrige Einbeere	ParisG	quadrifoliaArt	2013				Ab2	viele Fundorte, aber nur mässig oft registriert	
Gewöhnliche Schmerwurz	TamusG	communisArt	2013				Ab3	mässig viele Fundorte	
Vogelnestwurz	NeottiaG	nidus-avisArt	2013				Ab1	mässig viele Fundorte	

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste	letzte	1990 – 2002		Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	2001	2011			
Hängende Segge	Carex	pendulaArt	2013				Ab2	mässig viele Fundorte und meist nicht inventarisiert	
Schlaffe Segge	Carex	flaccaArt	2012				Ab2	viele Fundorte	
Weisse Segge	Carex	albaArt	2013				Ab5	mässig viele Fundorte, hier oft in grosser Dichte	
Gefingerte Segge	Carex	digitataArt	2013				Ab2	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Wald-Segge	Carex	sylvaticaArt	2013				Ab4	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Rot-Schwengel	Festuca	rubraArt	2013				Ab1	viele Fundorte registriert, wahrscheinlich sehr viele	
Wald-Zwenke	Brachypodium	sylvaticumArt	2012				Ab4	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Knautgras	DactylisG	glomerataArt	2013				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Nickendes Perlgras	Melica	nutansArt	2013				Ab3	mässig viele Fundorte	
Italienisches Raygras, Vielblütiger Lolch	Lolium	multiflorumArt	2013				Ab2	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Weizen	TriticumG	aestivumArt	2013				Ab2	nur 2 Funde registriert	
Horstbildende Schmieie, Rasenschmieie	DeschampsiaG	caespitosaArt	2012				Ab1	viele Fundorte, aber nur mässig oft registriert	
Wolliges Honiggras	HolcusG	lanatusArt	2013				Ab3	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Ausgebreitete Waldhirse	MiliumG	effusumArt	2012				Ab2	viele Fundorte im Wald, aber nur mässig häufig registriert	
Rohrglanzgras	PhalarisG	arundinaceaArt	2013				Ab2	mässig viele Fundorte, aber hier oft in grosser Dichte	
Gefleckter Aronstab	ArumG	maculatumArt	2013				Ab2	viele Fundorte	