

Weide Ruttigen am Südosthang des Born Artenliste Georg Artmann-Graf

Beobachtungsdauer: BP1 = 1990 bis 1998 (2001): 31 Std. 10 Min. BP2 (2002) 2008 bis 2011: 26 Std. 45 Min.

Berechnung des	Arten:	Anzahl:	BP1	BP2	Summe:	BP1	BP2	Summe / Anzahl:	BP1	BP2
Seltenheits-Index der Fauna:	Ereignisse:		261	270		583	548		2,23	2,09
			507	489		897	787		1,79	1,66

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990	2002	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Seltenheits-Index
----------------	-------------------------	------------------	-------------------	------	------	---	-----------------------------------	-------------------

WEICHTIERE			1995						
Schwarzer Schnegel	Limax	cinereoniger	2008	2008		1 E	1 E Ab1	mässig häufig gefunden weil selten danach gesucht, gilt nach Literatur als mässig häufig	4
Genabelte Strauschschnecke	Fruticicola = Bradybaena	fruticum	1997	2012	3 E	5 E	8 E Ab2	sehr häufig gefunden	1
Riemenschnecke	Helicodonta	obvoluta	2008	2008		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Seidenhaarschnecke	Trochulus = Trichia	sericeus	1998	2004	3 E	2 E	5 E Ab1	sehr häufig gefunden, gilt nach Literatur als sehr häufig	1
Gemeine Heideschnecke	Helicella	itala	1998	1998	1 E		1 E registriert Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schwarzmündige Bänderschnecke	Cepaea	nemoralis	1998	1998	1 E		1 E Ab1	sehr häufig gefunden	1
Weinbergschnecke	Helix	pomatia	1995	2008	2 E	2 E	4 E Ab1	sehr häufig gefunden	1
GLIEDERFÜSSLER			1990						
SPINNENTIERE			1990						
Weberknechte-, Zimmermann Familie	(Phalangidae)	non det.	1995	1998	2 E		2 E Ab1	sehr häufig gefunden, aber meist nicht registriert	-
Streckerspinne Gattung	Tetragnatha	sp.	1998	2008	1 E	1 E	2 E Ab2	Gattung häufig gefunden	2

F = Fundort
BP: Beobachtungsperiode
E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Ort und Datum.

Der Zusatz "registriert" bei sehr häufigen Taxa (Arten, Gattungen oder Familien) bedeutet, dass ich diese öfters beobachtet, aber oft nicht mehr notiert habe. Bei den Vögeln stammen diese Registraturen meist aus früheren Jahren.

Die Abundanzen werden dabei nicht berücksichtigt.

Grösste am Ort beobachtete Abundanzstufe (Ab): 1 = 1 bis 2 Individuen 2 = 3 bis 9 Individuen 3 = 9 bis ca. 25 Individuen 4 = ca. 25 bis ca. 100 Individuen 5 = über 100 Individuen

Bemerkungen zur Art in der Region:

sehr häufig gefunden: mehr als 500 Ereignisse, Index: 1 mässig häufig gefunden: 31 bis 100 Ereignisse, Index: 4 selten gefunden: 3 bis 9 Ereignisse, Index: 16
häufig gefunden: 100 bis 499 Ereignisse, Index: 2 wenig häufig gefunden: 10 bis 30 Ereignisse, Index: 8 sehr selten gefunden: 1 bis 2 Ereignisse, Index: 32

Regio Basiliensis: Erste Zahl: Anzahl besetzte Quadrate zu 25 qkm zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura** und südlichsten Teil des **Tafeljuras**, Perimeter 600–645 / 235–250
Zweite Zahl: Anzahl beobachtete Individuen zwischen 1980 und 2004 im **Faltenjura**, Perimeter 580–645 / 235–250

		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum				Seltenheits-Index			
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region		
Herbstspinnen-Art	Metellina	mengei	2008	2008		1 E	1 E Ab1	mässig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	4
Eichblatt-Radspinne	Aculepeira	ceropegia	2008	2008		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Gartenkreuzspinne	Araneus	diadematus	1997	1998	1 E		1 E Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 7	1
Radnetzspinnen-Art	Atea	triguttata	2008	2008		1 E	1 E Ab1	selten gefunden , in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 7	16
Baldachinspinnen-Art	Linyphia	triangularis	2008	2011		2 E	2 E Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 4	1
Wolfsspinnen-Art	Aulonia	albimana	1998	1998	1 E		1 E Ab1	wenig häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 30	8
Wolfsspinnen-Art	Pardosa	hortensis	1990	2010	5 E	2 E	7 E Ab4	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 219	1
Listspinne	Pisaura	mirabilis	1990	2010	5 E	3 E	8 E Ab2	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9	1
Labyrinthspinne Gattung	Agelena	sp.	1995	2012	3 E	7 E	10 E Ab5	Gattung sehr häufig gefunden, wahrscheinlich zum grössten Teil Agelena labyrinthica	1
Grasgrüne Huschspinne	Micrommata	virescens	1995	1995	1 E		1 E Ab4	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2
Veränderliche Krabbenspinne	Misumena	vatia	1998	2010	1 E	2 E	3 E Ab1	sehr häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14	1
Krabbenspinne Gattung	Xysticus	sp.	2008	2008		1 E	1 E registriert Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Krabbenspinnen-Art	Xysticus	cristatus	1995	1995	1 E		1 E Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14	2
Springspinnen-Art	Evarcha	arcuata	1997	2010	1 E	2 E	3 E Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Springspinne Gattung	Heliophanus	sp.	2008	2008		1 E	1 E registriert Ab1	Gattung häufig gefunden	2
INSEKTEN			1990						
Eintagsfliegen			1990						
Eintagsfliege Ordnung	(Ephemeroptera)	non det.	1990	1995	2 E		2 E Ab1	mässig häufig gefunden, nicht inventarisiert	-
Libellen			1995						
Gebänderte Prachtlibelle	Calopteryx	splendens	1995	1995	1 E		1 E Ab1	Gattung an Flüssen und Bächen häufig gefunden	2
Grosse Königslibelle	Anax	imperator	2011	2011		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden, oft auch weit ab von Gewässern	2

3

			E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Selten
Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		heits- Index
Ohrwürmer			1998						
Gemeiner Ohrwurm	Forficula	auricularia	1998	2008	1 E	1 E	2 E Ab1	häufig gefunden	2
Heuschrecken			1990						
Gemeine Sichelschrecke	Phaneroptera	falcata	2008	2012		2 E	2 E Ab2	früher mässig häufig gefunden, jetzt in Ausbreitung begriffen und häufig	2
Punktierte Zartschrecke	Leptophyes	punctatissima	1998	1998	1 E		1 E Ab1	häufig gefunden	2
Grünes Heupferd	Tettigonia	viridissima	1990	2011	2 E	2 E	4 E Ab3	sehr häufig gefunden	1
Westliche Beissschrecke	Platycleis	albopunctata	2008	2011		3 E	3 E Ab2	im Jura sehr häufig gefunden, im Flachland wenig häufig	1
Roesels Beissschrecke	Metrioptera	roeselii	1990	2010	2 E	1 E	3 E Ab4	sehr häufig gefunden	1
Gewöhnliche Strauchschrecke	Pholidoptera	griseoaptera	1990	2011	4 E	5 E	9 E Ab4	sehr häufig gefunden	1
Feldgrille	Gryllus	campestris	1990	2010	6 E	3 E	9 E Ab4	sehr häufig gefunden, vor allem im Jura, aber in letzter Zeit zunehmend auch im Flachland	1
Waldgrille	Nemobius	sylvestris	1995	2008	2 E	2 E	4 E Ab2	sehr häufig gefunden, vor allem an Waldrändern	1
Langfühler-Dornschrecke	Tetrix	tenuicornis	1990	2012	3 E	4 E	7 E Ab2	sehr häufig gefunden	1
Lauschschrecke	Mecostethus = Parapleurus	parapleurus	1995	2011	2 E	2 E	4 E Ab2	sehr häufig gefunden, aber erst in den letzten etwa zehn Jahren	1
Buntbäuchiger Grashüpfer	Omocestus	rufipes	1995	2008	2 E	1 E	3 E Ab4	im Jura häufig gefunden, aber anspruchsvolle Art	2
Rote Keulenschrecke	Gomphocerippus = Gomphocerus	rufus	1990	2012	4 E	1 E	5 E Ab5	sehr häufig gefunden	1
Brauner Grashüpfer	Chorthippus	brunneus	1995	1995	1 E		1 E Ab2	sehr häufig gefunden	1
Nachtigall-Grashüpfer	Chorthippus	biguttulus	1990	2012	5 E	5 E	10 E Ab5	sehr häufig gefunden	1
Gemeiner Grashüpfer	Chorthippus	parallelus	1990	2011	4 E	3 E	7 E Ab5	sehr häufig gefunden	1
Wanzen			1995						
Kugelwanze	Coptosoma	scutellatum	1995	1998	2 E		2 E Ab4	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 7	4
Beerenwanze	Dolycoris	baccarum	1997	2008	1 E	1 E	2 E Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11	1

								E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum		Seltenheits-Index
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	
Leder- oder Saumwanzen-Art	Coreus	marginatus	2008	2010		3 E	3 E Ab1		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5	1
Leder- oder Saumwanzen-Art	Coriomeris	denticulatus	2010	2010		1 E	1 E Ab1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4
Glasflügelwanzen-Art	Rhopalus	subrufus	1995	2010	1 E	1 E	2 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	2
Glasflügelwanzen-Art	Stictopleurus	punctatonervosus	1998	2010	1 E	2 E	3 E Ab1		häufig gefunden	2
Feuerwanze	Pyrrhocoris	apterus	2008	2008		1 E	1 E Ab1		sehr häufig gefunden, lokal oft massenhaft, besonders an Linden	1
Bodenwanzen-Art	Rhyparochromus	pini	1998	1998	1 E		1 E Ab1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 32	4
Sichelwanzen-Art	Aptus	mirmicoides	1995	1995	1 E		1 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 36	2
Sichelwanzen-Art	Nabis	rugosus	2008	2008		1 E	1 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 28	2
Weichwanzen-Art	Deraeocoris	ruber	1995	1998	2 E		2 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 74	2
Gemeine Wiesenwanze	Lygus	pratensis	1995	2012	1 E		2 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 46	2
Weichwanzen-Art	Stenotus	binotatus	2010	2010		1 E	1 E Ab1		mässig häufig gefunden	4
Weichwanzen-Art	Hadrodemus	M-flavum	1998	2010	1 E	1 E	2 E Ab1		häufig gefunden	2
Weichwanzen-Art	Notostira	erratica	2008	2008		1 E	1 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 30	2
Gleichflügler			1995							
Schaumzikade Familie	(Cercopidae)	non det. (Nest)	1995	1998	2 E		2 E Ab1		Unterfamilie: Schaumnester sehr häufig gefunden	1
Schaumzikaden-Art	Lepyronia	coleoprata	2008	2012		2 E	2 E Ab1		häufig gefunden	2
Dornzikade, Buckelzikade	Centrotus	cornutus	1998	1998	1 E		1 E Ab1		mässig häufig gefunden	4
Netzflügler			1995							
Florfliegen-Art	Chrysopa	perla	2008	2008		1 E	1 E Ab1		häufig gefunden	2
Goldauge, Florfliegen-Art	Chrysoperla	carnea	1995	1995	1 E		1 E Ab1		sehr häufig gefunden, überwintert oft in unseren Häusern	1
			2009							

			E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	
Käfer			2009						
Sandlaufkäfer Gattung	Cicindela	sp.	1998	1998	1 E		1 E Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Laufkäfer-Art	Diachromus	germanus	1998	1998	1 E		1 E Ab1	häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 206	2
Kanalkäfer-, Kamelläufer-Art	Amara s.str.	aenea	1998	1998	1 E		1 E Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 22	4
Dungkugelkäfer-Art	Sphaeridium	lunatum	2010	2010		1 E	1 E Ab2	auf Kuhfladen häufig gefunden, aber nur mässig oft registriert	2
Raubkäfer-Art (Kurzflügler)	Platydacus	latebricola	1998	1998	1 E		1 E Ab1	selten gefunden	16
Weichkäfer-Art	Cantharis	rustica	1998	2010	2 E	2 E	4 E Ab4	sehr häufig gefunden	1
Weichkäfer-Art	Cantharis	livida	2010	2010		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden	2
Rotgelber Weichkäfer	Rhagonycha	fulva	1995	2011	1 E	2 E	3 E Ab2	sehr häufig gefunden	1
Grosser Blasenkäfer	Malachius	aeneus	2010	2010		1 E	1 E Ab1	mässig häufig gefunden	4
Zweifleckiger Warzenkäfer	Malachius	bipustulatus	1998	2008	1 E	1 E	2 E Ab1	häufig gefunden	2
Schwarzer Wollhaarkäfer	Dasytes	niger	2011	2011		1 E	1 E Ab1	wenig häufig gefunden	8
Bienenwolf-, Immenkäfer-Art	Trichodes	alvearius	2010	2010		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden	2
Zahnhalziger Schnellkäfer	Denticollis	linearis	2010	2010		1 E	1 E Ab1	wenig häufig gefunden	8
Saatschnellkäfer-Art	Agriotes	gallicus	1997	2011	1 E	1 E	2 E Ab1	häufig gefunden	2
Zierliches Prachtkäferchen	Anthaxia	nitidula	1995	1998	2 E	1 E	3 E Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 117	2
Glanzkäfer Gattung	Meligethes	sp.	1998	1998	1 E		1 E Ab2	Gattung sehr häufig gefunden	1
Siebenpunkt	Coccinella	septempunctata	1998	1998	1 E		1 E Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	femorata	1995	2011	2 E	1 E	3 E Ab1	häufig gefunden	2
Graugrüner Schenkelkäfer	Oedemera	virescens	1998	2008	1 E	2 E	3 E Ab1	häufig gefunden	2
Schenkelkäfer-Art	Oedemera	lurida	1995	1995	1 E		1 E Ab1	häufig gefunden	2

6		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	
Feuerkäfer-Art	Pyrochroa serraticornis	2008	2010		2 E	2 E Ab1		häufig gefunden	2
Gebänderter Stachelkäfer	Variimorda villosa	1995	2008	2 E	1 E	3 E Ab2		sehr häufig gefunden	1
Kotkäfer Gattung	Onthophagus sp.	1990	1990	1 E		1 E Ab1		Gattung mässig häufig gefunden	4
Blatthornkäfer-Art	Valgus hemipterus	2010	2010		1 E	1 E Ab1		seit einigen Jahren in Ausbreitung, derzeit häufig gefunden	2
Gemeiner Rosenkäfer	Cetonia aurata	1995	2010	2 E	2 E	4 E Ab1		häufig gefunden	2
Schmalbock-Art	Stenocorus meridianus	2010	2010		1 E	1 E Ab1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	4
Feldahornbock, Tabakfarbiger Schmalbock	Alosterna tabacicolor	2010	2010		1 E	1 E Ab1		häufig gefunden, in den Bodenfallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	2
Roter Schmalbock, Roter Halsbock	Corymbia = Leptura rubra	2008	2008		1 E	1 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 36	2
Gefleckter Schmalbock	Leptura = Strangalia maculata	1995	2011	2 E	2 E	4 E Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 21	1
Schwarzschwänziger Schmalbock	Stenurella = Strangalia melanura	1995	2010	1 E	1 E	2 E Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14	1
Kleiner Eichenbock, Buchenbock	Cerambyx scopolii	1998	1998	1 E		1 E Ab1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4
Echter Widderbock	Clytus arietis	2010	2010		1 E	1 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 58	2
Lilienhähnchen-Art	Liliocerus merdigera	2011	2011		1 E	1 E Ab1		wenig häufig gefunden	8
Blauer Langbeinkäfer	Smaragdina salina	1998	2010	1 E	1 E	2 E Ab1		häufig gefunden	2
Goldiger Fallkäfer	Cryptocephalus aureolus	1990	2010	3 E	2 E	5 E Ab1		auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus hypochoeridis	1995	2011	3 E	2 E	5 E Ab2		auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Fallkäfer-Art	Cryptocephalus violaceus	2010	2010		2 E	2 E Ab2		auf Blumen sehr häufig gefunden, besonders auf gelben	1
Schneeballblattkäfer	Pyrrhalta viburni	2010	2010		1 E	1 E Ab4		sehr häufig gefunden	1
Hautflügler		1990							
Birken-Knopfhornblattwespe	Cimbex femoratus	1990	1990	1 E		1 E Ab1, einer von nur zwei Funden in der Reg.!		selten gefunden	16
Blattwespen-Art	Athalia circularis	1995	1997	2 E		2 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14	2

			E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum					Seltenheits-Index	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region		
Blattwespen-Art	Athalia	cordata	2010	2010		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 13	2
Blattwespen-Art	Allantus	didymus	1998	1998	2 E		2 E Ab2	wenig häufig gefunden	8
Blattwespen-Art	Tenthredo	solitaria	2008	2008		1 E	1 E Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4
Blattwespen-Art	Tenthredo	zona	2008	2008		1 E	1 E Ab1	wenig häufig gefunden	8
Blattwespen-Artkomplex	Tenthredo	marginella-Komplex	2008	2008		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden, möglicherweise zwei verschiedene Arten	2
Blattwespen-Art	Tenthredo	vespa	1995	1995	1 E		1 E Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 6	2
Blattwespen-Art	Macrophya	annulata = ligata	1995	1998	2 E		2 E Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 18	2
Blattwespen-Art	Macrophya	montana	2010	2010		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden	2
Blattwespen-Art	Macrophya	alboannulata	1990	1990	1 E		1 E Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	4
Blattwespen-Art	Cladius	pectinicornis	2010	2010		1 E	1 E Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 54	4
Schlupfwespen-Art	Amblyteles	armatorius	1998	1998	1 E		1 E Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schlupfwespe Gattung	Phygadeuon	sp.	2008	2008		1 E	1 E Ab1	Gattung mässig häufig gefunden	4
Schlupfwespen-Art	Trychosis	tristator	2010	2010		1 E	1 E Ab1	wenig häufig gefunden	8
Schlupfwespen-Art	Hadrodactylus	fugax	2010	2010		1 E	1 E Ab1, einziger Fund in der Region, unsicher best.	erst 2 Mal gefunden	32
Gemeine Rosengallwespe (Galle)	Diplolepis	rosae (Galle)	1997	2012	1 E	2 E	3 E Ab1	sehr häufig gefunden	1
Schwarzgraue Wegameise	Lasius	niger	1998	2008	1 E	1 E	2 E Ab3	sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 1248 Individuen	1
Gelbe Wegameise	Lasius	flavus	1998	1998	1 E		1 E Ab3	sehr häufig gefundenin den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 495 Individuen	1
Grauschwarze Sklavenameise	Formica	fusca	2008	2008		1 E	1 E Ab3	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 236	2
Gewöhnliche Sklavenameise	Formica	cunicularia	1997	2010	4 E	2 E	6 E Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 271	1
Wiesen-Waldameise	Formica	pratensis	1998	2010	1 E	6 E	7 E Ab4	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5	1
Rote Waldameise	Formica	rufa	2008	2008		1 E	1 E Ab4	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 3037 Individuen	2

erste letzte 1990 2002
Beob- Beob- – –
acht. acht. 2001 2011

Bemerkungen zur Art im
Beobachtungsgebiet

Bemerkungen zur Art in der Region

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen								
Lehmwespen-Art	Euodynerus	notatus	1995	1995	1 E		1 E Ab1	selten gefunden	16
Mörtel- oder Lehmwespen-Art	Ancistrocerus	nigricornis	1998	2010	1 E	2 E	3 E Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 12	2
Französische Feldwespe	Polistes	dominulus	1995	2010	2 E	1 E	3 E Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 23, nistet an Felsen	1
Hornisse	Vespa	crabro	1990	2008	1 E	1 E	2 E Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	1
Deutsche Wespe	Vespula	germanica	1997	2008	1 E	1 E	2 E Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 83	1
Wegwespen-Art	Cryptocheilus (Adonta)	versicolor	2010	2010		1 E	1 E Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	4
Wegwespen-Art	Arachnospila	spissa	2010	2010		1 E	1 E Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 70	4
Holzbohrwespen- oder Töpfergrabwespen-Art	Trypoxylon	attenuatum	1995	1995	1 E		1 E Ab1	wenig häufig gefunden	8
Gewöhnliche Maskenbiene	Hylaeus	communis	1995	2011	1 E	1 E	2 E Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 26	2
Verkannte Maskenbiene	Hylaeus	confusus	1995	1995	1 E		1 E Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 16	2
Gelbbindige Furchenbiene	Halictus	scabiosae	2008	2012		3 E	3 E Ab2	die Art galt vor zehn Jahren noch als "vom Aussterben bedroht", derzeit ist sie häufig	2
Furchenbienen-Art	Halictus	simplex	1990	2012	3 E	4 E	7 E Ab3	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 17	1
Gewöhnliche Furchenbiene	Halictus	tumulorum	1997	2012	4 E	4 E	8 E Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 29	1
Schmalbienen-Art	Lasioglossum	leucozonium	1995	1998	2 E		2 E Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2
Gewöhnliche Schmalbiene	Lasioglossum	calceatum	1990	2012	4 E	6 E	10 E Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 50	1
Schmalbienen-Art	Lasioglossum	albipes	1990	1998	2 E		2 E Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Feldweg-Schmalbiene	Lasioglossum	malachurum	1998	1998	1 E		1 E Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 76	2
Breitkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	laticeps	1995	2008	3 E	2 E	5 E Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) sehr häufig: 616	1
Lappenspornige Schmalbiene	Lasioglossum	pauxillum	1997	2008	3 E	2 E	5 E Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 49	1
Braunfühler-Schmalbiene	Lasioglossum	fulvicorne	2011	2011		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 45	2
Dickkopf-Schmalbiene	Lasioglossum	glabriusculum	2011	2011		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden	2

erste letzte 1990 2002
Beob- Beob- – –
acht. acht. 2001 2011

Bemerkungen zur Art im
Beobachtungsgebiet

Bemerkungen zur Art in der Region

Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen								
Zottige Schmalbiene	Lasioglossum	villosulum	1997	2008	3 E	1 E	4 E Ab2	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	1
Grüne Goldschmalbiene	Lasioglossum	nitidulum	1997	1997	1 E		1 E Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	4
Dunkelgrüne Goldschmalbiene	Lasioglossum	morio	1995	1998	5 E		5 E Ab1	sehr häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 93	1
Blutbienen-Art	Sphecodes	ephippius	1998	1998	1 E		1 E Ab1	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2
Blutbienen-Art	Sphecodes	ferruginatus	1997	1998	4 E		4 E Ab2	häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2
Blutbienen-Art	Sphecodes	hyalinatus	1995	1995	1 E		1 E Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	4
Blutbienen-Art	Sphecodes	crassus	2010	2010		1 E	1 E Ab1	mässig häufig gefunden, den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	4
Winzige Sandbiene	Andrena	minutula	2008	2008		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 13	2
Sandbienen-Art	Andrena	humilis	1995	2010	2 E	3 E	5 E Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14	2
Sandbienen-Art	Andrena	fulvata	2008	2008		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 242	2
Gesellige Sandbiene	Andrena	carantonica = jacobi	1998	1998	1 E		1 E Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11	4
Sandbienen-Art	Andrena	gravida	2008	2008		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 35	2
Weissdorn-Sandbiene	Andrena	bucephala	1998	1998	1 E		1 E Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 17	4
Glockenblumen-Sägehornbiene	Melitta	haemorrhoidalis	1997	2008	1 E	1 E	2 E Ab1	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Gemeine Wollbiene	Anthidium	manicatum	1995	1998	2 E		2 E Ab2	häufig gefunden	2
Kleine Harzbiene	Anthidium	strigatum	1995	1995	1 E		1 E Ab1	mässig häufig gefunden	4
Hahnenfuss-Scherenbiene	Chelostoma	florisomne	2008	2010		2 E	2 E Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 28	4
Zwerg-Scherenbiene	Chelostoma	campanularum	1995	1995	1 E		1 E Ab4	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 28	2
Rostrote Mauerbiene	Osmia	bicornis = rufa	2010	2010		1 E	1 E Ab1	sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11, dominierende	1
Zweifarbige Schneckenhaus-Mauerbiene	Osmia	bicolor	2008	2008		1 E	1 E Ab2	häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Platterbsen-Mörtelbiene	Megachile	ericetorum	1995	2011	1 E	1 E	2 E Ab1	mässig häufig gefunden	4

10		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	
Garten-Blattschneiderbiene	Megachile willoughbiella	1998	2010	1 E	1 E	2 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Vierfleck-Pelzbiene	Anthophora quadrimaculata	1997	1997	1 E		1 E Ab1		wenig häufig gefunden	8
Frühlings-Pelzbiene	Anthophora plumipes	2008	2008		1 E	1 E Ab1		häufig gefunden	2
Juni-Langhornbiene	Eucera longicornis	1995	1995	1 E		1 E Ab1		häufig gefunden	2
Wespenbienen-Art	Nomada goodeniana = succincta	1998	1998	2 E		2 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5	2
Wespenbienen-Art	Nomada hirtipes	2010	2010		1 E	1 E Ab1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	4
Wespenbienen-Art	Nomada fabriciana	2010	2010		1 E	1 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	2
Dunkle Erdhummel	Bombus terrestris	1990	2011	2 E	2 E	4 E Ab1		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 71	1
Helle Erdhummel	Bombus lucorum	1995	2011	2 E	2 E	4 E Ab4		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 262	1
Bergwaldhummel	Bombus wurfleini	1995	1995	1 E		1 E Ab1		häufig gefunden	2
Wiesenhummel	Bombus pratorum	1995	1995	1 E		1 E Ab1		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 30	1
Steinhummel	Bombus lapidarius	1990	2011	5 E	4 E	9 E Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 9	1
Ackerhummel	Bombus pascuorum	1990	2012	6 E	8 E	14 E Ab4		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 96	1
Veränderliche Hummel	Bombus humilis	1998	2011	1 E	3 E	4 E Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	1
Gartenhummel	Bombus hortorum	1995	2012	4 E	4 E	8 E Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 14	1
Bärtige Kuckuckshummel (der Gartenhummel)	Psithyrus barbutellus	1995	2010	1 E	1 E	2 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	2
Böhmische Kuckuckshummel (der Hellen Erdhummel)	Psithyrus bohemicus	2011	2011		1 E	1 E Ab1		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 11	1
Feld-Kuckuckshummel (der Ackerhummel)	Psithyrus campestris	1995	2012	2 E	2 E	4 E Ab2		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2
Felsen-Kuckuckshummel (der Steinhummel)	Psithyrus rupestris	1998	2008	1 E	1 E	2 E Ab1		häufig gefunden	2
Wald-Kuckuckshummel (der Wiesenhummel)	Psithyrus sylvestris	1990	1990	1 E		1 E Ab1		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 19	1
Honigbiene	Apis mellifera	1990	2012	7 E	7 E	14 E Ab5		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 489	1

11

			E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Selten	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	heits- Index
Köcherfliegen			1990							
Köcherfliege Ordnung	(Trichoptera)	non det.	1990	1990	1 E		1 E Ab1			1
Schmetterlinge			1990							
Kleiner Hopfen-Wurzelbohrer	Korscheltellus	lupulinus	2008	2008		1 E	1 E Ab1	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 16, 33		8
Langfühlermotten-Art	Nemophora	metallica	1998	2010	1 E	2 E	3 E Ab2	sehr häufig gefunden		1
Schwarzdorn-Gespinstmotte	Yponomeuta	padella	1995	1995	1 E		1 E Ab1	mässig häufig gefunden		4
Grasminiermotten-Art	Elachista	argentella	1998	2008	1 E	1 E	2 E Ab1	mässig häufig gefunden		4
Palpenmotten-Art	Acompsia	cinerella	1990	1990	1 E		1 E Ab1	mässig häufig gefunden		4
Zypressenwolfsmilch-Glasflügler	Chamaesphecia	empiformis	1998	2010	1 E	1 E	2 E Ab1	wenig häufig gefunden (11 Falter an 6 Orten), R.Bas.: 6, 48		8
Widderche Gattung	Zygaena	sp.	1990	1997	1 E		1 E Ab1	Gattung sehr häufig gefunden		1
Gewöhnliches Widderchen, "Blutströpfchen"	Zygaena	filipendulae	1997	2012	1 E	1 E	2 E Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 37, 1142		1
Wickler-Art	Celypha	lacunana	1990	1998	5 E		5 E Ab2	sehr häufig gefunden		1
Wickler-Art	Eucosma	cana	1995	1995	1 E		1 E Ab1	selten gefunden		16
Wickler-Art	Eucosma	hohenwartiana	1995	1995	1 E		1 E Ab1	wenig häufig gefunden		8
Wickler-Art	Dichrorampha	aeratana	2010	2010		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden		2
Federgeistchen-Art	Oxyptilus	pilosellae	1995	2008	2 E	1 E	3 E Ab2	mässig häufig gefunden		4
Fruchtzünsler-Art	Oncocera	semirubella	1995	2012	1 E	3 E	4 E Ab2	sehr häufig gefunden		1
Rispengraszünsler	Chrysoteuchia	culmella	1995	2010	2 E	1 E	3 E Ab4	sehr häufig gefunden		1
Graszünsler-Art	Crambus	pascuellus	1990	1990	1 E		1 E Ab1	mässig häufig gefunden		4
Graszünsler-Art	Crambus	lathoniellus	1990	2010	4 E	1 E	5 E Ab3	sehr häufig gefunden		1
Weisser Graszünsler	Crambus	perlellus	1995	2011	2 E	2 E	4 E Ab3	sehr häufig gefunden		1

12

			E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	
Graszünsler-Art	Agriphila	tristella	2008	2012		2 E	2 E Ab2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	inquinatella	1997	2012	1 E	1 E	2 E Ab2	sehr häufig gefunden	1
Graszünsler-Art	Agriphila	straminella	1995	2008	1 E	1 E	2 E Ab1	sehr häufig gefunden	1
Goldzünsler	Pyrausta	aurata	1998	2008	1 E	1 E	2 E Ab2	häufig gefunden	2
Purpurroter Zünsler	Pyrausta	purpuralis	1990	2012	5 E	4 E	9 E Ab5	sehr häufig gefunden	1
Olivbrauner Zünsler	Pyrausta	despicata	1990	2012	3 E	3 E	6 E Ab4	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Microstega	pandalis	1995	2008	1 E	2 E	3 E Ab2	sehr häufig gefunden	1
Zünsler-Art	Ebulea	crocealis	1990	1990	1 E		1 E Ab1	wenig häufig gefunden	8
Waldreben- Fensterschwärmerchen	Thyris	fenestrella	1995	1995	1 E		1 E Ab1	am Tag 17 Falter gefunden, R.Bas.: 1, 1	8
Braunkolbiger Braun-Dickkopffalter	Thymelicus	sylvestris	1995	2011	1 E	3 E	4 E Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 1243	1
Mattfleckiger Kommafalter	Ochlodes	venata	1995	2011	1 E	3 E	4 E Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 516	1
Dunkler Dickkopffalter	Erynnis	tages	2008	2011		3 E	3 E Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 34, 631	1
Kleiner Nördlicher Würfelfalter	Pyrgus	malvae	1998	2010	2 E	2 E	4 E Ab2	häufig gefunden, R.Bas.: 30, 338	2
Schwalbenschwanz	Papilio	machaon	1998	2010	1 E	2 E	3 E Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 340	1
Weissling Familie	(Pieridae)	non det.	1995	2012	5 E	7 E	12 E Ab3	weisse Weisslinge sehr häufig gefunden und registriert	1
Tintenfleckweissling-Komplex	Leptidea	sinapis-Komplex	2008	2012		5 E	5 E Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 20, 53	1
Grosser Kohlweissling	Pieris	brassicae	1998	2011	1 E	2 E	3 E Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 482	1
Kleiner Kohlweissling	Pieris	rapae	1995	2012	4 E	5 E	9 E Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1043	1
Karstweissling	Pieris	mannii	2011	2012		2 E	2 E Ab1	im August 2008 erstmals nachgewiesen, zur Zeit häufig, R.Bas.: 0, 0	2
Grünaderweissling, Rapsweissling	Pieris	napi	1990	2012	4 E	6 E	10 E Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 1549	1
Aurorafalter	Anthocaris	cardamines	1995	2010	4 E	2 E	6 E Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 757	1

13		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	
Gelbling-Komplex, Heufalter-Komplex	Colias	hyale Komplex	2010	2010		1 E	1 E Ab1	sehr häufig gefunden	1
Hufeisenklee-Gelbling Hufeisenklee-Heufalter	Colias	alfacariensis	1990	2011	2 E	1 E	3 E Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 29, 628	1
Zitronenfalter	Gonepteryx	rhamni	1995	2011	1 E	3 E	4 E Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 845	1
Kleiner Eisvogel	Limenitis	camilla	2008	2008		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 31, 124	2
Tagpfauenauge	Inachis	io	1998	2008	2 E	1 E	3 E Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 734	1
Admiral	Vanessa	atalanta	1995	2008	1 E	1 E	2 E Ab1	Wanderfalter, in manchen Jahren sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 224	1
Distelfalter	Vanessa = Cynthia	cardui	1990	1990	2 E		2 E Ab1	sehr häufiger Wanderfalter, von Jahr zu Jahr unterschiedlich, R.Bas.: 39, 483	1
Kleiner Fuchs	Aglais	urticae	1981	2010	5 E	1 E	6 E Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 44, 1238	1
C-Falter	Polygonia	c-album	2008	2008		1 E	1 E Ab1	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 32, 185	1
Landkärtchen	Araschnia	levana	2008	2008		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 39, 261	2
Kaisermantel	Argynnis	paphia	1995	2012	2 E	3 E	5 E Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 38, 531	1
Westlicher Scheckenfalter Mähwiesen-Scheckenfalter	Melitaea = Melicta	parthenoides	2010	2010		1 E	1 E Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 25, 510	2
Schachbrettfalter	Melanargia	galathea	1995	2011	2 E	3 E	5 E Ab5	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 4065	1
Grosses Ochsenauge, Kuhauge	Maniola	jurtina	1990	2012	4 E	4 E	8 E Ab5	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 43, 8476	1
Brauner Waldvogel	Aphantopus	hyperantus	1995	2011	1 E	3 E	4 E Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 40, 2287	1
Kleines Wiesenvögelchen	Coenonympha	pamphilus	1990	2012	8 E	5 E	13 E Ab4	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 42, 2818	1
Waldbrettspiel, Laubfalter	Pararge	aegeria	1990	2012	4 E	3 E	7 E Ab2	im Wald sehr häufig gefunden, R.Bas.: 41, 688	1
Mauerfuchs	Lasiommata	megera	2008	2012		6 E	6 E Ab3	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 39, 1139	1
Ulmen-Zipfelfalter	Satyrium	w-album	2008	2008		1 E	1 E Ab1	mässig häufig gefunden, R.Bas.: 17, 42	4
Brauner Feuerfalter	Lycaena	tityrus	2008	2011		3 E	3 E Ab2	sehr häufig gefunden, R.Bas.: 36, 627	1
Faulbaum-Bläuling	Celastrina	argiolus	2011	2011		1 E	1E Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 28, 82	2

14

			E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	
Kleiner Sonnenröschen-Bläuling	Aricia	agestis	1998	2012	1 E	1 E	2 E Ab1	häufig gefunden, R.Bas.: 27, 250	2
Violetter Wald-Bläuling	Polyommatus = Cyaniris	semiargus	1995	2011	2 E	3 E	5 E Ab2	sehr häufig gefunden , R.Bas.: 36, 904	1
Himmelblauer Bläuling	Polyommatus = Lysandra	bellargus	1990	2012	5 E	4 E	9 E Ab4	sehr häufig gefunden, aber Zeiger für wertvolle Lebensräume, R.Bas.: 37, 1142	1
Hauhechel-Bläuling	Polyommatus	icarus	1990	2012	7 E	7 E	14 E Ab3	sehr häufig gefunden, auch in trivialen Lebensräumen, R.Bas.: 43, 2315	1
Heidespanner	Ematurga	atomaria	1998	2010	1 E	4 E	5 E Ab4	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 19, 206	1
Spanner-Art	Scopula	immorata	1990	2010	5 E	1 E	6 E Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 16, 118	1
Spanner-Art	Scopula	nigropunctata	1995	1995	1 E		1 E Ab2	am Tag mässig häufig gefunden, R.Bas.: 6, 8	4
Spanner-Art	Scopula	ornata	1998	2010	2 E	1 E	3 E Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 111	2
Spanner-Art	Idaea	biselata	1995	1995	1 E		1 E Ab1	am Tag wenig häufig gefunden, R.Bas.: 16, 25	8
Spanner-Art	Idaea	humiliata	1995	1995	1 E		1 E Ab2	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 12, 338	2
Spanner-Art	Scotopteryx	bipunctaria	1997	1997	1 E		1 E Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 433	2
Löwenzahnspanner	Camptogramma	bilineata	1990	2012	4 E	4 E	8 E Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 31, 270	1
Mausspanner	Minoa	murinata	1995	2008	5 E	2 E	7 E Ab2	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 15, 41	2
Rosenmotte	Miltochrista	miniata	2011	2011		1 E	1 E Ab1	am Tag 9 schlafende Falter und mehrere am Licht gesehen, R.Bas.: 12, 77	4
Russicher Bär, Spanische Flagge	Euplagia	quadripunctaria	2008	2008		1 E	1 E Ab2	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 25, 118	2
Braune Tageule	Euclidia	glyphica	1995	2011	3 E	4 E	7 E Ab2	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 27, 495	1
Gammaeule	Autographa	gamma	1990	2012	4 E	4 E	8 E Ab1	am Tag sehr häufig gefunden, R.Bas.: 33, 776	1
Eulenfalter-Art	Panemeria	tenebrata	1998	2010	1 E	1 E	2 E Ab1	am Tag häufig gefunden, R.Bas.: 2, 8	2
Schnabelfliegen			2009						
Alpen-Skorpionsfliege	Panorpa	alpina	2008	2008		1 E	1 E Ab1	mässig häufig gefunden	4
Deutsche Skorpionsfliege	Panorpa	germanica	1997	1998	2 E		2 E Ab1	sehr häufig gefunden	1

15		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	
Gewöhnliche Skorpionsfliege	Panorpa communis	1997	2008	1 E	1 E	2 E Ab2		sehr häufig gefunden	1
Skorpionsfliege (nicht genau bestimmt)	Panorpa vulgaris cf. communis	1990	1998	3 E		3 E Ab2		sehr häufig gefunden	1
Gemeine Skorpionsfliege	Panorpa vulgaris	1998	2008	1 E	1 E	2 E Ab2		sehr häufig gefunden	1
Zweiflügler		1990							
Schnaken-Art	Tipula U.g. Lunatipula	1995	2010	4 E	2 E	6 E Ab4		sehr häufig gefunden	1
Kammschnaken-Art	Tanyptera	2010	2010		1 E	1 E Ab1		mässig häufig gefunden	4
Kriebelmücke Familie	(Simuliidae)	1995	2008	2 E	1 E	3 E Ab2		sehr häufig gefunden	1
Märzmücke	Bibio marci	1998	1998	2 E		2 E Ab2		häufig gefunden, lokal oft in sehr grosser Zahl	2
Waffenfliegen-Art	Actina chalybea	1998	1998	1 E		1 E Ab1		mässig häufig gefunden	4
Waffenfliegen-Art	Chloromyia formosa	1995	2010	2 E	1 E	3 E Ab2		häufig gefunden	2
Regenbremsen-Art	Haematopota = Chrysozona	1995	1995	1 E		1 E Ab1		sehr häufig gefunden	1
Bremsen-Art	Tabanus bovinus	2010	2010		1 E	1 E Ab1		mässig häufig gefunden	4
Raubfliegen-Art	Dioctria rufipes	2010	2010		1 E	1 E Ab1		häufig gefunden	2
Wollschweber-Art	Bombylius major	1998	1998	1 E		1 E Ab1		sehr häufig gefunden	1
Wollschweber-Art	Bombylius cinerascens	1998	2010	1 E	2 E	3 E Ab2		häufig gefunden	2
Tanzfliegen-Art	Empis (Eue.) tesselata	2008	2010		2 E	2 E Ab1		sehr häufig gefunden	1
Tanzfliegen-Art	Empis (Krite.) livida	1998	1998	1 E		1 E Ab1		häufig gefunden	2
Gelbhaarige Wiesenschwebfliege Schwarzmund-Heckenschwebfliege	Epistrophe melanostoma	2008	2008		1 E	1 E Ab1		mässig häufig gefunden	4
Gemeine Winter- oder Parkschwebfliege	Episyrphus balteatus	1995	2012	4 E	2 E	6 E Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 200	1
Späte Grossstirnschwebfliege, Weisse Dickkopfschwebfliege	Scaeva pyrastris	1998	1998	1 E		1 E Ab1		häufig gefunden	2
Gemeiner Kugelträger, Gemeine Stiftschwebfliege	Sphaerophoria scripta	1990	2012	4 E	5 E	9 E Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	1

16		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	
Kugelträger-Art	Sphaerophoria taeniata	1995	1995	1 E		1 E Ab1		häufig gefunden	2
Zweiband-Wespenschwebfliege	Chrysotoxum bicinctum	1995	2010	2 E	1 E	3 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	2
Gemeine Schwarzkopf- oder Grasschwebfliege	Melanostoma mellinum	1997	2010	2 E	1 E	3 E Ab1		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 58	1
Heideschwebfliegen-Art	Paragus haemorrhous	1990	1990	1 E		1 E Ab1		mässig häufig gefunden	4
Gemeine Zwergschwebfliege	Pipizella viduata	1995	2008	2 E	1 E	3 E Ab1		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 8	1
Bärlauch- Erzschwebfliege Impressa-Gruppe	Cheilosia fasciata	2010	2010		1 E	1 E Ab1		mässig häufig gefunden	4
Schwarze Erzschwebfliege Impressa-Gruppe	Cheilosia impressa	1997	2012	1 E	1 E	2 E Ab3		häufig gefunden	2
Weissfuss-Erzschwebfliege Antigua-Gruppe	Cheilosia albitarsis	1998	2008	1 E	1 E	2 E Ab2		sehr häufig gefunden	1
Gemeine Schnauzenschwebfliege, Feld-Schnabelschwebfliege	Rhingia campestris	1997	2012	2 E	2 E	4 E Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 5	1
Gebänderte Waldschwebfliege, Gelbe Hummelschwebfliege	Volucella inanis	2008	2008		1 E	1 E Ab1		mässig häufig gefunden	4
Gemeine Waldschwebfliege, Gemeine Hummelschwebfliege	Volucella pellucens	1995	1995	1 E		1 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 3	2
Grosskopf-Zwiebelschweb- fliege	Eumerus ornatus	1995	1995	1 E		1 E Ab1		mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 12	4
Gemeine Narzissenschwebfliege, Gemeine Zwiebelschwebfliege	Merodon equestris	1995	1998	2 E		2 E Ab1		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2
Kleine Keilfleckschwebfliege, Kleine Bienen-schwebfliege	Eristalis arbustorum	1997	2012	1 E	1 E	2 E Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 1 Individuum	1
Keilfleckschwebfliegen-Art	Eristalis interrupta	1997	1997	1 E		1 E Ab2		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) selten: 4	1
Keilfleckschwebfliegen-Art, Distel-Binenenschwebfliege	Eristalis jugorum	1997	2012	1 E	2 E	3 E Ab2		sehr häufig gefunden	1
Gemeine Keilfleckschwebfliege Lange Bienen-schwebfliege	Eristalis pertinax	1997	2008	1 E	1 E	2 E Ab2		sehr häufig gefunden	1
Grosse "Mistbiene", Wanderer	Eristalis tenax	1990	2012	5 E	5 E	10 E Ab5		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) mässig häufig: 57	1
Grosse Sumpfschwebfliege, Grosse Sonnenschwebfliege	Helophilus parallelus	1997	2012	1 E	1 E	2 E Ab3		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) nur 2 Individuen	2
Totenkopfschwebfliege	Myathropa florea	1995	2012	4 E	5 E	9 E Ab3		sehr häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 18	1
Gemeine Langbauchschwebfliege Gemeine Holzschwebfliege	Xylota segnis	2008	2010		2 E	2 E Ab2		häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) häufig: 160	2

			E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Selten
Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste	letzte	1990	2002	Bemerkungen zur Art im		heits-
			Beob-	Beob-	–	–	Bemerkungen zur Art im	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			acht.	acht.	2001	2011	Beobachtungsgebiet		
Goldhaar-Langbauchschwebfliege, Goldhaar-Holzschwebfliege	Xylota	sylvarum	1995	1995	1 E		1 E Ab1	mässig häufig gefunden, in den Fallen der WSL (P. Flückiger) wenig häufig: 19	4
Augenfliege Gattung	Pipunculus	sp.	1998	1998	1 E		1 E Ab1	Gattung selten registriert	-
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	atra	1998	1998	1 E		1 E Ab1	häufig gefunden	2
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	pusilla	1997	1997	1 E		1 E Ab1	mässig häufig gefunden	4
Dickkopffliegen-Art	Thecophora	distincta	2010	2010		1 E	1 E Ab1	mässig häufig gefunden	4
Dickkopffliegen-Art	Sicus	ferrugineus	2008	2008		1 E	1 E Ab2	sehr häufig gefunden	1
Dickkopffliegen-Art	Dalmannia	marginata	1998	1998	2 E		2 E Ab4, einer von drei Fundorten in der Region!	selten gefunden	16
Fruchtfiegen-Art	Oxyna	flavipennis	1995	1995	1 E		1 E Ab1	mässig häufig gefunden	4
Netzfliegen-Art	Trypetoptera	punctulata	1995	1998	3 E		3 E Ab1	mässig häufig gefunden	4
Netzfliegen-Art	Pherbina	coryleti	1995	1995	1 E		1 E Ab1	selten gefunden	16
Netzfliegen-Art	Limnia	unguicornis	1995	1998	3 E		3 E Ab2	häufig gefunden	2
Kotfliegen-Art	Scatophaga	lutaria	1998	1998	1 E		1 E Ab1	mässig häufig gefunden	4
Kaisergoldfliege	Lucilia	caesar	1990	1990	1 E		1 E registriert Ab1	vermutlich sehr häufig, aber nur selten registriert	-
Schmeissfliege Gattung	Pollenia	sp.	1997	1997	1 E		1 E registriert Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Fleischfliege Gattung	Sarcophaga	sp.	1995	2010	4 E	1 E	5 E registriert Ab2	Gattung sehr häufig gefunden, nach 2011 nicht mehr registriert	1
Raupenfliegen-Art	Eriothrix	rufomaculata	1997	1997	1 E		1 E Ab2	häufig gefunden	2
Raupenfliege Gattung	Gymnosoma	sp.	1995	2011	3 E	1 E	4 E Ab2	Gattung sehr häufig gefunden	1
Raupenfliege Gattung	Tachina	sp.	1990	1998	4 E		4 E Ab1	Gattung sehr häufig gefunden	1
Raupenfliegen-Art	Tachina = Echinomyia	fera	2008	2012		3 E	3 E Ab1	häufig gefunden, aber oft nicht registriert	1
WIRBELTIERE	Auswahl	ohne sehr häufige Arten	1965						
Grasfrosch	Rana	temporaria	1997	1997	1 E		1 E Ab1	häufig gefunden	2

18		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	
Zauneidechse	Lacerta agilis	1990	2012	5 E	3 E	8 E Ab2		sehr häufig gefunden, fehlt aber im Siedlungsraum weitgehend (Hauskatzen!)	2
Schwarzer Milan (Schwarzmilan)	Milvus migrans	1970	1970	1 E		1 E Ab1		häufig beobachtet	2
Roter Milan (Rotmilan)	Milvus milvus	1970	2012	1 E	1 E	2 E		sehr häufig beobachtet	1
Mäusebussard	Buteo buteo	1967	1990	3 E		3 E registriert Ab1		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Turmfalke	Falco tinnunculus	1970	2008	2 E	1 E	3 E Ab1		häufig beobachtet	2
Grauspecht	Picus canus	1965	1965	1 E		1 E Ab1		früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch wenig häufig	4
Grünspecht	Picus viridis	1967	2012	4 E	2 E	6 E Ab1		sehr häufig beobachtet	1
Schwarzspecht	Dryocopus martius	2008	2012		3 E	3 E Ab1		sehr häufig beobachtet	1
Buntspecht	Dendrocopos = Dryocopus major	1970	1990	2 E		2 E registriert Ab1		sehr häufig beobachtet	1
Zaunkönig	Troglodytes troglodytes	1967	1990	2 E		2 E registriert Ab1		sehr häufig beobachtet, aber nur an wenigen Orten registriert	-
Heckenbraunelle	Prunella modularis	2008	2008		1 E	1 E Ab1		häufig beobachtet	2
Rotkehlchen	Erithacus rubecula	1967	1990	4 E		4 E registriert Ab2		sehr häufig beobachtet, aber nur an wenigen Orten registriert	-
Hausrotschwanz	Phoenicurus ochruros	1990	1990	1 E		1 E registriert Ab1		sehr häufig beobachtet, aber nur an wenigen Orten registriert	-
Amsel	Turdus merula	1967	1990	4 E		4 E registriert Ab2		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Wacholderdrossel	Turdus pilaris	1965	1965	1 E		1 E Ab1		häufig beobachtet, aber in letzter Zeit weniger	4
Singdrossel	Turdus philomelos	1967	1990	2 E		2 E registriert Ab1		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Gartengrasmücke	Sylvia borin	2008	2008		1 E	1 E Ab1		häufig beobachtet	2
Mönchsgrasmücke	Sylvia atricapilla	1990	1990	1 E		1 E registriert Ab1		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Laubsänger Gattung	Phylloscopus sp.	1990	1990	1 E		1 E registriert Ab1		Gattung sehr häufig beobachtet	-
Berglaubsänger	Phylloscopus bonelli	1995	1995	1 E		1 E Ab1		häufig beobachtet	2
Waldlaubsänger	Phylloscopus sibilatrix	1998	1998	1 E		1 E Ab1		früher häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren nur noch selten	4

19		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet		Bemerkungen zur Art in der Region	
Zilpzalp	Phylloscopus collybita	1967	1970	2 E		2 E registriert Ab1		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Wintergoldhähnchen	Regulus regulus	1970	1970	1 E		1 E registriert Ab1		häufig beobachtet	2
Sommergoldhähnchen	Regulus ignicapillus	1967	1970	2 E		2 E registriert Ab1		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Grauschnäpper	Muscicapa striata	2008	2008		1 E	1 E Ab1		mässig häufig beobachtet	4
Trauerschnäpper	Ficedula hypoleuca	2008	2008		1 E	1 E Ab1		häufig beobachtet	2
Schwanzmeise	Aegitalus caudatus	1965	1998	4 E		4 E Ab2		häufig beobachtet	2
Nonnenmeise oder Sumpfmeise	Parus palustris	1965	1967	2 E		2 E registriert Ab1		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Blaumeise	Parus caeruleus	1967	1967	1 E		1 E registriert Ab1		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Kohlmeise	Parus major	1965	1970	3 E		3 E registriert Ab1		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Kleiber, Spechtmeise	Sitta europaea	1990	1990	1 E		1 E registriert Ab1		sehr häufig beobachtet	-
Waldbaumläufer	Certhia familiaris	1998	1998	1 E	1 E	2 E Ab1		häufig beobachtet	2
Gartenbaumläufer	Certhia brachydactyla	1967	2008	3 E	3 E	6 E Ab1		sehr häufig beobachtet	1
Neuntöter, Rotrückiger Würger	Lanius collurio	1998	2008	1 E	2 E	3 E Ab2		häufig beobachtet	2
Eichelhäher	Garrulus glandarius	1990	1990	1 E		1 E registriert Ab1		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Dohle	Corvus monedula	1970	1970	1 E		1 E Ab2		mässig häufig beobachtet	4
Rabenkrähe	Corvus corone	1970	1990	2 E		2 E registriert Ab2		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Kolkrabe	Corvus corax	1995	2011	4 E	4 E	8 E Ab2		sehr häufig beobachtet	1
Star	Sturnus vulgaris	1990	1990	1 E		1 E registriert Ab4		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Buchfink	Fringilla coelebs	1967	1967	2 E		2 E registriert Ab2		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Grünfink	Carduelis chloris	1970	1970	1 E		1 E registriert Ab1		sehr häufig beobachtet, aber nur in wenigen Gemeinden regelmässig registriert	-
Stieglitz, Distelfink	Carduelis carduelis	1990	1998	2 E		2 E Ab2		häufig beobachtet	2

			E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Selten
Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste	letzte	1990	2002	Bemerkungen zur Art im		heits-
			Beob-	Beob-	–	–	Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	Index
			acht.	acht.	2001	2011			
Gimpel, Dompfaff	Pyrrhula	pyrrhula	1967	1967	1 E		1 E Ab1	häufig beobachtet, aber in den letzten Jahren seltener	2
Goldammer	Emberiza	citrinella	2011	2011		1 E	1 E Ab1	sehr häufig beobachtet	1
Maulwurf	Talpa	europaea	1998	2010	1 E	2 E	3 E (Spuren) Ab2	anhand der Spuren sehr häufig festgestellt	1
Feldhase	Lepus	europaeus	1965	1965	1 E		1 E Ab1	Sichtbeobachtungen mässig häufig, aber anhand der Spuren häufig nachgewiesen	2
Eichhörnchen	Sciurus	vulgaris	2008	2008		1 E	1 E Ab1	häufig beobachtet	2
Schermaus	Arvicola	terrestris	2010	2010		1 E	1 E (Spuren) registriert Ab2	anhand der Spuren sehr häufig festgestellt	1
Dachs	Meles	meles	2010	2010		1 E	1 E (Spuren) Ab1	anhand der Spuren häufig festgestellt	2
Wildschwein	Sus	scrova	1998	2012	1 E	2 E	3 E (Spuren) Ab5	anhand der Spuren zunehmend häufiger festgestellt	2
Reh	Capreolus	capreolus	1965	2008	1 E	1 E	2 E (Spuren)	häufig beobachtet und anhand der Spuren festgestellt	2
BLAUALGEN	Auswahl		2008						
Blualgen-Art	Nostoc	commune	2008				lokal häufig	mässig viele Fundorte	
MOOSE	Auswahl		1981						
Echter Wolfsfuss	Anomodon	viticulosus	1981				lokal sehr häufig an schattigem Felsen	mässig viele Fundorte	
Zartes Thujamoos	Thuidium	recognitum aggr. delicatulum	2008				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Grosses Kranzmoos	Rhytidiadelphus	triquetrus	2008				lokal häufig	viele Fundorte	
SAMENPFLANZEN			1965						
Stinkende Nieswurz	Helleborus	foetidus	1967				kommt im Wald und am Waldrand vor	viele Fundorte	
Gewöhnliche Akelei	Aquilegia	vulgaris	1998				lokal sehr häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Gewöhnliche Waldrebe	Clematis	vitalba	1966				kommt vor	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Knolliger Hahnenfuss	Ranunculus	bulbosus	1966				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Sauerdorn	Berberis	vulgaris	2008				1 grosser Strauch	mässig viele Fundorte	

21

			E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Selten
Deutsche Namen	Wissenschaftliche	Namen	erste	letzte	1990	2002	Bemerkungen zur Art im		heits- Index
			Beob- acht.	Beob- acht.	– 2001	– 2011	Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	
Alpen-Johannisbeere	Ribes	alpinum	1998				1 Sträuchlein auf Felsen	wenig Fundorte	
Milder Mauerpfeffer	Sedum	sexangulare	1998				lokal häufig	viele Fundorte	
Gewöhnlicher Odermennig	Agrimonia	eupatoria	1966				mässig häufig	viele Fundorte	
Kleiner Wiesenknopf	Sanguisorba	minor	1966				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Aufrechtes Fingerkraut	Potentilla	erecta	1997				lokal häufig	viele Fundorte	
Frühlings-Fingerkraut	Potentilla	verna = neumanniana	2008				lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Wald-Erdbeere	Fragaria	vesca	2010				lokal sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Gemeiner Frauenmantel, Gelbgrüner Frauenmantel	Alchemilla	xanthochlora aggr. = vulgaris = pratensis	2010				lokal mässig häufig	viele Fundorte, aber vermutlich oft übersehen	
Feldrose	Rosa	arvensis	2010				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Hundsrose	Rosa	canina	1966				kommt vor	sehr viele Fundorte , aber nur wenig häufig registriert	
Brombeere i.w.S.	Rubus	fruticosus	1966				sehr häufig in der Weide	sehr viele Fundorte , aber nur mässig häufig registriert	
Birnbaum	Pyrus	piraster	1998				2 grosse Bäume und vereinzelt Jungbäume	viele Fundorte	
Apfelbaum	Malus	sylvestris	1998				2 Bäume	mässig viele Fundorte	
Garten-Steinmispel	Cotoneaster	horizontalis	2012				1 Strauch	mässig viele Fundorte, unsicher bestimmt	
Schwarzdorn, Schlehdorn	Prunus	spinosa	2008				sehr häufig	viele Fundorte	
Kriechende Hauhechel	Ononis	repens	1966				mässig häufig	viele Fundorte	
Mittlerer Klee	Trifolium	medium	2010				lokal häufig	viele Fundorte	
Gewöhnlicher Rotklee	Trifolium	pratense pratense	1966				kommt vor	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Kriechender Klee	Trifolium	repens	1966				sehr häufig	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Gewöhnlicher Wundklee	Anthyllis	vulneraria vulneraria	2008				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Gewöhnlicher Hornklee Wiesen-Schotenklee	Lotus	corniculatus	1966				kommt vor	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	

22		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region		
Bunte Kronwicke	Coronilla varia	1995				häufig	viele Fundorte		
Schopfiger Hufeisenklee	Hippocrepis comosa	1966				lokal häufig	viele Fundorte		
Gewöhnliche Vogel-Wicke	Vicia cracca	2011				lokal häufig	viele Fundorte		
Wald-Weidenröschen	Epilobium angustifolium	1966				kommt vor	mässig viele Fundorte		
Wiesen-Lein, Purgier-Lein	Linum catharticum	1998				lokal sehr häufig	viele Fundorte		
Bittere Kreuzblume	Polygala amarella	1998				häufig	viele Fundorte		
Gewöhnliche Kreuzblume	Polygala vulgaris vulgaris	1998				lokal mässig häufig	viele Fundorte		
Roter Hartriegel	Cornus sanguinea	1966				kommt vor	sehr viele Fundorte, aber nur ausnahmsweise registriert		
Europäische Sanikel	Sanicula europaea	1998				lokal mässig häufig	wenig Fundorte		
Kleine Bibernelle	Pimpinella saxifraga	1997				lokal häufig	viele Fundorte		
Silgenähnlicher Rosskümmel	Silaum silaus	1998				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Wilde Möhre	Daucus carota	1966				häufig	viele Fundorte		
Sonnenwend-Wolfsmilch	Euphorbia helioscopia	1990				häufig, unsicher bestimmt	wenig Fundorte, weil oft nicht registriert		
Aufrechte Wolfsmilch	Euphorbia stricta	2011				häufig	mässig viele Fundorte		
Warzige Wolfsmilch	Euphorbia verrucosa	1998				häufig	viele Fundorte		
Mandelblättrige Wolfsmilch	Euphorbia amygdaloides	1966				häufig, lokal sehr häufig	viele Fundorte		
Zypressen-Wolfsmilch	Euphorbia cyparissias	1966				häufig	viele Fundorte		
Gew. Seidelbast, Zilande	Daphne mezereum	1967				vereinzelt	mässig viele Fundorte		
Lorbeer-Seidelbast	Daphne laureola	1967				vereinzelt im Wald	viele Fundorte		
Behaartes Johanniskraut	Hypericum hirsutum	2010				häufig	viele Fundorte		
Echtes Johanniskraut	Hypericum perforatum	1966				lokal häufig	sehr viele Fundorte		

23		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	
Rauhhaariges Veilchen	Viola	hirta	2008				kommt vor	sehr viele Fundorte	
Wald-Veilchen	Viola	reichenbachiana = sylvestris	2008				häufig, lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Fieder-Zahnwurz	Cardamine = Dentaria	heptaphylla	2008				lokal häufig im Wald	mässig viele Fundorte , aber oft in grosser Anzahl	
Kahles Turmkraut	Turritis = Arabis	glabra	1990				mässig häufig	wenig Fundorte	
Sigmarskraut	Malva	alcea	1990				lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Wald-Schlüsselblume	Primula	elator	2008				lokal mässig häufig im Wald	viele Fundorte	
Gew. Frühlings-Schlüsselblume	Primula	veris	1966				häufig, lokal sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Graufilzige Frühlings-Schlüsselblume	Primula	veris columnae = veris suaveolens	2008				mässig häufig im Wald	wenig Fundorte	
Pfennigkraut	Lysimachia	nummularia	1966				mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Gewöhnliches Leimkraut	Silene	vulgaris vulgaris	2010				lokal häufig	viele Fundorte	
Echtes Tausenguldenkraut	Centaurium	erythraea	1990				mässig häufig	mässig viele Fundorte	
Gefranster Enzian	Gentiana	ciliata	1998				1 Pflanze	mässig viele Fundorte	
Gewöhnliches Kreuzlabkraut	Cruciata	laevipes	1998				lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Niedriges Labkraut	Galium	pumilum	1998				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Zwerg-Holunder, Attich	Sambucus	ebulus	1995				lokal sehr häufig unter Bäumen	mässig viele Fundorte	
Gewöhnlicher Schneeball	Viburnum	opulus	1966				kommt vor	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Wilde Karde	Dipsacus	fullonum = silvestris	2008				lokal häufig	viele Fundorte	
Acker-Witwenblume	Knautia	arvensis	1966				häufig	sehr viele Fundorte	
Tauben-Skabiose	Scabiosa	columbaria	1966				lokal sehr häufig	viele Fundorte	
Echter Steinsame	Lithospermum	officinale	1998				lokal mässig häufig	wenig Fundorte	
Gewöhnlicher Natterkopf	Echium	vulgare	1966				vereinzelt	mässig viele Fundorte	

24		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region		
Dunkelgrünes Lungenkraut	Pulmonaria	obscura	2008				lokal mässig häufig im Wald	viele Fundorte	
Blasenkirsche, Laternenpflanze Judenkirsche	Physalis	alkekengi	2010				lokal mässig häufig	erst 1 Mal gefunden	
Schwarzer Nachtschatten	Solanum	nigrum	2008				lokal mässig häufig auf Feldweg	wenig Fundorte	
Kleiner Klappertopf	Rhinanthus	minor	2008				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Schmalblättriger Klappertopf	Rhinanthus	glacialis	1998				lokal sehr häufig	wenig Fundorte	
Schuppenwurz	Lathraea	squamaria	2008				lokal mässig häufig im Wald	sehr wenig Fundorte	
Mittlerer Wegerich	Plantago	media	1966				häufig	viele Fundorte	
Grosser Wegerich	Plantago	major major	1966				kommt vor	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Spitzwegerich	Plantago	lanceolata	1966				kommt vor	sehr viele Fundorte, aber mässig häufig registriert	
Grosse Brunelle	Prunella	grandiflora	1998				mässig häufig, lokal häufig	viele Fundorte	
Kleine Brunelle	Prunella	vulgaris	1966				kommt vor	sehr viele Fundorte, aber nur rmässig häufig registriert	
Berg-Goldnessel	Lamium = Lamiastrum	galeoptolon montanum	2008				sehr häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Echte Betonie	Stachys = Betonica	officinalis	1966				sehr häufig	viele Fundorte	
Klebrige Salbei	Salvia	glutinosa	1990				sehr häufig, besonders am Waldrand	mässig viele Fundorte	
Wiesen-Salbei	Salvia	pratensis	1966				sehr häufig	viele Fundorte	
Wald-Bergminze = Echter Bergthymian	Calamintha	menthifolia = sylvatica Bromfield	1990				lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Echter Dost, Wilder Majoran	Origanum	vulgare	1966				häufig	viele Fundorte	
Arznei-Feld-Thymian	Thymus	pulegioides	1998				sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Rundblättrige Glockenblume	Campanula	rotundifolia	1966				lokal häufig	sehr viele Fundorte	
Pfirsichblättrige Glockenblume	Campanula	persicifolia	2011				1 Pflanze	mässig viele Fundorte	
Acker-Glockenblume	Campanula	rapunculoides	2010				lokal mässig häufig	viele Fundorte	

			E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen		erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	
Ährige Rapunzel	Phyteuma	spicatum	2010				vereinzelt im Wald	viele Fundorte	
Wasserdost	Eupatorium	cannabinum	1966				lokal mässig häufig am Waldrand	viele Fundorte	
Ausdauerndes Gänseblümchen	Bellis	perennis	1966				kommt vor	sehr viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Berg-Aster	Aster	amellus	1998				vereinzelt	mässig viele Fundorte	
Scharfes Berufkraut	Erigeron	acer acer	1966				kommt vor	wenig Fundorte	
Wiesen-Schafgarbe	Achillea	millefolium	1966				kommt vor	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Gewöhnliche Wiesen-Margerite	Leucanthemum	vulgare	1966				häufig, lokal sehr häufig	sehr viele Fundorte	
Straussblütige Margerite = Doldenmargerite	Tanacetum = Chrysanthemum	corymbosum	2010				2 Pflanzen	wenig Fundorte	
Huflattich	Tussilago	farfara	1970				kommt vor	viele Fundorte	
Raukenblättriges Kreuzkraut	Senecio	erucifolius	1966				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Raukenblättriges Kreuzkraut	Senecio	erucifolius	1998				lokal mässig häufig	viele Fundorte	
Jakobs-Kreuzkraut	Senecio	jacobaea	2011				häufig	viele Fundorte	
Gewöhnliche Eberwurz, Golddistel	Carlina	vulgaris	1966				lokal häufig	viele Fundorte	
Silberdistel = Einfache Eberwurz	Carlina	acaulis ssp. caulescens = simplex	1998				vereinzelt	viele Fundorte	
Grosse Klette	Arctium	lappa	2008				lokal häufig im Wald	wenig Fundorte	
Sumpf-Kratzdistel	Cirsium	palustre	1966				kommt vor	viele Fundorte	
Stengellose Kratzdistel	Cirsium	acaule	1998				kommt vor	viele Fundorte	
Skabiosen-Flockenblume	Centaurea	scabiosa	1966				häufig	viele Fundorte	
Wiesen-Flockenblume	Centaurea	jacea s.l.	1966				häufig	sehr viele Fundorte	
Wegwarte, Zichorie	Cichorium	intybus	1966				sehr häufig	viele Fundorte	
Gew. Rauhes Milkkraut	Leontodon	hispidus	1966				sehr häufig	sehr sehr viele Fundorte	

26		E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum						Seltenheits-Index	
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen	erste Beob-acht.	letzte Beob-acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region		
Langhaariges Habichtskraut	Hieracium pilosella	1998				lokal sehr häufig	viele Fundorte		
Bärlauch	Allium ursinum	2008				sehr häufig im Wald	sehr viele Fundorte, aber nur selten registriert		
Rosslauch	Allium oleraceum	2008				lokal mässig häufig im Wald	viele Fundorte		
Türkenbundlilie	Lilium martagon	1990				sehr häufig im Wald, häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt		
Blaustern	Scilla bifolia	1965				häufig im Wald	mässig viele Fundorte, hier oft in grosser Anzahl		
Märzenglöcklein, Hegerli, Frühlings-Knotenblume	Leucojum vernum	1965				lokal häufig im Wald	wenig Fundorte		
Gewöhnliche Schmerwurz	Tamus communis	1998				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte		
Mücken-Handwurz	Gymnadenia conopsea	1998				lokal mässig häufig	viele Fundorte, nach NHV geschützt		
Hummel-Ragwurz	Ophrys holosericea	1998				2 Pflanzen	wenig Fundorte, im Kanton Solothurn geschützt.		
Helm-Orchis	Orchis militaris	1998				2 Pflanzen	mässig viele Fundorte, im Kanton Solothurn geschützt.		
Männliche Orchis	Orchis mascula	1998				lokal mässig häufig	viele Fundorte, nach NHV geschützt		
Spitzorchis, Pyramidenorchis	Anacamptis pyramidalis	1990				lokal mässig häufig	mässig viele Fundorte, nach NHV geschützt		
Feld-Hainsimse	Luzula campestris	2008				häufig, lokal sehr häufig	viele Fundorte		
Berg-Segge	Carex montana	1998				lokal sehr häufig	viele Fundorte und oft in grosser Dichte		
Filzfrüchtige Segge	Carex tomentosa	1998				lokal sehr häufig	wenig Fundorte		
Frühlings-Segge	Carex caryophyllea	1998				sehr häufig	viele Fundorte, typisch für Magerrasen		
Schlaffe Segge	Carex flacca	1998				sehr häufig	viele Fundorte		
Gefingerte Segge	Carex digitata	2010				lokal häufig am Waldrand	viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert		
Aufrechte Trespe	Bromus erectus	1966				sehr häufig	sehr viele Fundorte		
Rot-Schwingel	Festuca rubra	2008				lokal häufig	viele Fundorte registriert, wahrscheinlich sehr viele		
Fieder-Zwenke	Brachypodium pinnatum	1966				kommt vor am Waldrand	viele Fundorte		

		erste Beob- acht.	letzte Beob- acht.	1990 – 2001	2002 – 2011	E = Fundereignis: Nachweis einer Art an einem bestimmten Datum		Selten- heits- Index
Deutsche Namen	Wissenschaftliche Namen					Bemerkungen zur Art im Beobachtungsgebiet	Bemerkungen zur Art in der Region	
Platthalm-Rispengras	Poa compressa	1990				lokal häufig	mässig viele Fundorte	
Mittleres Zittergras	Briza media	1998				häufig	viele Fundorte	
Knautgras	Dactylis glomerata	1966				kommt vor	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Nickendes Perlgras	Melica nutans	2008				vereinzelt, lokal mässig häufig am Waldrand	mässig viele Fundorte	
Hoher Glatthafer	Arrhenatherum elatius	1966				kommt vor	sehr viele Fundorte, aber nur mässig häufig registriert	
Kriechender Windhalm	Agrostis stolonifera	1966				kommt vor	viele Fundorte, aber nur wenig häufig registriert	
Gefleckter Aronstab	Arum maculatum	1981				kommt vor	viele Fundorte	